



阿蓮木瓜生長好

阿蓮木瓜風味香甜

陳益裕專訪

本省木瓜分布很普遍，但南部較好。因高溫乾燥，生育快，果大風味甜。高雄縣阿蓮鄉生產的，很有名。阿蓮鄉是平地，靠山邊。各村莊都栽滿了果樹：芒果、荔枝、龍眼、釋迦、柑桔。田園間，山丘上，家庭院落裡，零星分布著木瓜樹，也到處可見。

鄉農會推廣股陳家富先生說：「阿蓮鄉木瓜栽培面積大概有二百公頃左右，一年約有九一三萬台斤，每天平均二五、〇〇〇台斤運銷中北部。」

在當地果菜市場裡，我訪問了一位鄭姓的老農友，他說一般農家全靠

一般農作物（如水稻）的收成，是不夠家庭開支的，還得種種果樹，像栽木瓜，收益快，資

金的周轉才能靈活些。」

另一位太太說：「木瓜栽培比較容易，本錢也比較少，收穫期又長，價格也還好，是一種好青果。」

鄭老農友有六、七分地。我也去參觀他的木瓜園，園地除了木瓜外，還有別的果樹間作。他說：

「種木瓜，最怕的是颱風，颱風一來，損害很大，如果幸運沒有遇到颱風，還可賺點錢。」

木瓜忌水，所以種木瓜要選擇地勢高燥的地方，比較適合。一個完善的木瓜園，應做高畦，開設排水溝。

爲了防患風災水災，有些農友在木瓜四周圍防風籬，而且都作倒株定

植法。也就是主莖與地面成四十五度傾斜，有防風效果，同時可抑制生長，減低結果高度，便於採收。」

住石安村的賴見成農友，對木瓜栽培也很有經驗。

他說：「入冬以後種木瓜，由於遇到一段低溫時間，木瓜植株長得矮些，粗壯，根部發育良好。在高溫多濕季節裡種木瓜，較易徒長，將來結果部位也高，採收不方便。」

他的木瓜園設有抽水機，以便遇旱時可抽水灌溉。因爲木瓜根部雖然忌浸，不耐濕，但木瓜是淺根性作物，也不耐旱，如果亢旱日久，生育緩慢，授粉不良，易落花落果，肉質變硬，成熟期延遲，植株壽命也短。

青旗村一位賴石定農友指出：

木瓜樹成齡後，如肥料供應適當，對促進結實，有很大幫助。因爲養分充足，木瓜會不斷開花結果，生長勢旺盛。有機質肥料，可改良木瓜園土壤性質，瓜肉軟甜味香。

目前阿蓮鄉的阿蓮村、清蓮村、和蓮村，以及石安、青旗等地，都開闢不少的木瓜園，但都不是專業經營，而是一種附帶性的耕種。單作多，與鳳梨、柳橙間作的也不少。由於生長結果快，從定植後不到一年便可收穫，通常收穫後的第一、二年，產量最高，以後將依次減少了，需要作更新的準備。

目前阿蓮鄉一般農友栽種的木瓜品種，大部分爲鳳山雜交二號，也有蘇魯種，果型均豐整光滑、肉色濃，商品價值高。很多農友都表示，栽種木瓜，要慎選品種。優良的品種植株健壯，禦水性强，結果肉厚，糖分高，色、香、味具佳。

提高乳牛產乳量

養乳牛的收入有：①出售牛奶，②出售種公牛或種母牛，③出售淘汰的乳牛或乳公牛作肉用。其中以出售牛奶爲主。

提高乳牛產乳量的方法爲有計畫的淘汰、配種及好好的飼養乳牛。要做好這三項工作必須要有個別乳牛的泌乳記錄。

農復會、農林廳於六三年一月聘用八位技術員進行乳牛產乳量測定工作，協助酪農建立完善的乳牛生產性狀記錄。

六四年八月間，又得美國飼料谷物協會駐台辦事處之助，邀得美國東南十一州乳牛改良資料處理中心負責人甫鵠博士來台做技術指導。

至今，乳牛產乳量測定工作因限於財力、人力，只在彰化及桃園等地酪農村進行。目前產乳量測定的乳牛共一、〇一二頭，包括彰化福寶二一六頭，彰化秀水一三五頭，桃園沙崙一八五頭，彰化福寶一七八頭，桃園五權二九八頭。這些資料經過產乳日數及乳脂含量修正後，將寄還給酪農供淘汰及育種之用。

根據這些資料將算出地區性及個別酪農的乳牛平均產乳量，再根據平均產乳量決定配種的種公牛的精液來。同時，根據平均產乳量，求出乳牛的給飼標準，以提高牛乳產量。

（公樹說）