

四季海棠全年開花

林雄

秋海棠屬的種類，不下二千種，如再加上雜交的品種，為數更多。除交配種的球根海棠外，大部分分佈於熱帶和亞熱帶。原產地遍及我國、日本、巴西、墨西哥、印度等，尤其是巴西最為豐富。本省亦有五、六個自生種。

秋海棠屬分佈很廣，有性喜強光的，也有喜日陰又多濕環境的。不但生態特性互異，性狀也大不相同。其中又有專供觀葉和觀花的區別，更有以花葉共賞的種類。不過種類雖多，生態特性固然大異其趣，但是葉形有一共通的特徵。任何種類葉形均呈不等邊的卵形乃至心臟形，葉緣具鋸齒狀。

在很多種類當中，目前最受歡迎而風行盆栽園藝的，首推四季海棠。因四季海棠整年開花，繁殖容易，栽培簡單。其花色鮮艷，葉色嫩綠，對比分明，觀賞價值高。

四季海棠學名 Begonia Sem



盆栽四季海棠

Per florens，巴西原產。植株高約自一五公分至六〇公分不等，莖葉平滑具光澤。弱光下如水分高，葉色淡綠，日照強則成為赤色。

生長適溫為攝氏二〇—三〇度，冬季氣溫不低於一〇度，生育就不致受影響。雖可在日照下照常生育，如溫度高又過分乾燥或多濕，則降低品質，嚴重時造成落花落葉。反之日照不足，花多褪色。除苗期需要一段日陰培育外，應在適宜的日照下管理。用土宜排水良好，富有機質。如再混合四〇%的腐葉或泥炭更好。土壤酸鹼度pH宜在五·五—六之間。

四季海棠的種類又分為以種子繁殖的單瓣系統，和營養繁殖的重瓣系統。單瓣系統的固定種、交配種的種類很多，一般均屬矮株性，基部分枝多。花色有紅、白、桃、鑲邊等。葉色淡綠或棕色，日光弱呈淡綠，日光強常變成赤色。重瓣系統的花形有球狀和茶花狀，花色不一，葉色和單瓣系統無異。

四季海棠從播種到開花，為期僅四、六個月。種子細小，營利栽培要獲得大量苗株，並不困難。不過種子太小，播種用土非一一經過消毒不可。一般盆播，無需覆土，行盆底吸水浸水浸透，保持攝氏二〇—二五度，約一周即可發芽。

插芽繁殖行於無法實生的重瓣系統。插穗要選自枝莖的中段和基部，有二節具腋芽。枝梢頂芽雖能發根伸長，但葉腋僅能抽花不可能萌芽，無法培植較多莖數。插穗有二、三公分長度即夠，要帶葉，但可剪除一半，以免水分蒸散，插穗凋萎。

芽插前先浸於清水中一小時，充分吸水後，才可扦插。高溫期為顧慮插穗容易腐爛，可減少灌水，代之以全株噴霧，就可防凋萎，又不致葉溫上升，也能促進發根。

分株繁殖有短期內養成新植株之便，但繁殖量甚少。分株法每一株需具有四、五莖，盆植後，即在莖基近於腋芽的位置剪去上端，如此有利下部腋生腋芽。如腋芽細小或不多，萬勿將莖基剪得太低，變成無葉，降低光合成機能，導致生育遲緩。

實生苗本葉二、三枚，即行移植，以免發生徒長。移苗作業，最好利用小竹板或鐵子。四季海棠的生長點在基部，栽植不可過深。淺植除可防苗腐外，並可避免埋沒生長點。同時應行設立墜道式的膠布覆蓋，並保持略微高濕的環境。苗期中，實生苗隨生育順利自成長良好的株形。插芽苗因腋芽少，生長期應行二次摘心，促生側枝增加芽數。分株苗有一次的摘心即可。

定植先用一二公分口徑的瓦盆（素燒盆），等到根羣充分發生，如看到盆排水孔，根已伸出，應行換盆。冬季如有霜害地方，應有

保溫設施。普通的花棚加蓋透明膠布，便可供用。一旦霜害條件解除，就可移露天。

四季海棠開花不停，花謝後花瓣常落於葉面，不但傷害葉片，亦能引起病害，應時常加以清除。

無霜地帶，除了幼苗期間外，如本省平地，長年露地管理，絕少有任何影響。管理上有適度的日照，通風良好，就能培育很理想的盆栽。如在酷暑的強光下，應稍加遮蔭。

四季海棠生長健強，性喜日照，已不限於盆栽，做為花壇材料，也很相宜。外國則盛行箱栽，以供美化都市街道之用。



四季海棠 (呂福和)