

優良庭園樹

林樹之

樟樹為樟科，學名是 *Cinnamomum*

Camphora Sieber。全株具樟腦香味，故別名為香樟。

葉互生潤

卵形或橢圓形

先端尖銳

波緣為其特殊

處。花黃綠色

雌雄同花，

漿果球形，未

熟時綠色，成

熟時呈紫黑色

木材可供箱

櫃等用處。

樟樹是常

綠喬木，栽作

庭園樹或行道

樹可以遮大太陽，尤其台灣處

於熱帶、亞熱帶大太陽下，更

需要它來遮擋。樟樹利用多量

陽光行光合作用，不但製造人

類所需的木材，而且吸取人類

所需要的二氧化碳，清淨了

空氣。又可吸收大氣中的熱，

所以當我們在樹下納涼時感到

十分涼爽。

樟樹可栽作鄉村或城市裡的行道樹，年數久了，樹態雄壯威武，屆老齡，更有古道、老樹的景色。

樟樹通常用種子繁殖，其

法如下：

採果及種子處理：樟樹果

在台灣西部於十一月前後採摘

，東部於八月中旬至九月中旬

採摘。一般採法多用高枝剪，剪落生有果實的小枝，或在樹下鋪布用長竿打落，收集後將

苗床管理：苗床每隔七

十天除草一次，除草時最好用

手指按住苗根拔草。拔草時如

遇固結或表土太硬時，即須用

小耙子搔起破碎土塊。拔草後

即行灌溉一次，如遇連續十

數日晴天，即須於薄暮時充分灌

水。如發現樟苗葉部發黃時，表示缺肥，可施用加二十倍水的腐熟人糞尿或其他化學肥料溶液。

病蟲害防治：大蟋蟀、蟻

蟬等害蟲，可於整地時放入B H C 粉劑防治。樟紋毛虫可用石油乳劑驅除。苗木罹白綿病

後，苗木下部葉多呈灰色及灰褐色斑紋，是因為苗木過於擁擠，通風不良所致，故須間拔

其浸入硫酸三%溶液中三小時，然後將硫酸液傾出，用水洗

淨下播。

播種採用條播法。在寬一

公尺的苗床上，每隔二十五至三十公分，掘寬十公分，深○

七公分的橫溝，溝底要平坦，然後將種子三十五或四十五粒擺於溝內，用手指輕壓，用篩篩土輕覆○・七公分厚，然後鋪以稻草或谷壳，保持土壤適度。

移植與定植：樟苗如發育良好滿一年生即可定植。如生長欠佳則以移植於廢鐵桶，再繼續生長一年較佳。法將用完沙拉油廢桶上部用開罐頭刀自邊緣全部開啓，底部用粗鐵釘打鏟四或五個孔以利排水，然後用涼乾的溝土或園土、培養土（三分之一堆肥，三分之一壤土，三分之一發酵後的豬糞）等填入油桶內，桶內殘餘油亦不必洗淨，任其發酵充為肥料。

壤土一半將苗木種入，繼續壤土至離桶頂緣一~二公分即可，然後將桶整齊的置放於陽光不太強的樹下或北向的屋簷下，如有蔭棚更佳。俟甦醒後移置陽光充足處方可。

移入苗桶前應充分澆水，以後亦應經常洒水，保持桶內土壤適潤。放於陽光下後，自上午九、十點鐘至下午三、四點鐘止，仍應搬至樹下或屋簷

下。

如發現有根長出底部孔外，須立即用修剪鋸剪斷，桶內如發現雜草，隨時拔除，如此定植時，如鐵桶未達容易病蟲害防治：大蟋蟀、蟻

蟬等害蟲，可於整地時放入B

H C 粉劑防治。樟紋毛虫可用石油乳劑驅除。苗木罹白綿病

後，苗木下部葉多呈灰色及灰褐色斑紋，是因為苗木過於擁

擠，通風不良所致，故須間拔

其浸入硫酸三%溶液中三小時，然後將硫酸液傾出，用水洗

淨下播。

播種採用條播法。在寬一

公尺的苗床上，每隔二十五至三十公分，掘寬十公分，深○

七公分的橫溝，溝底要平坦，然後將種子三十五或四十五

粒擺於溝內，用手指輕壓，用篩篩土輕覆○・七公分厚，然

後鋪以稻草或谷壳，保持土壤

適度。

移植與定植：樟苗如發育

良好滿一年生即可定植。如生

長欠佳則以移植於廢鐵桶，再

繼續生長一年較佳。法將用完

沙拉油廢桶上部用開罐頭刀自

邊緣全部開啓，底部用粗鐵釘

打鏟四或五個孔以利排水，然

後用涼乾的溝土或園土、培養

土（三分之一堆肥，三分之一

壤土，三分之一發酵後的豬糞

）等填入油桶內，桶內殘餘油

亦不必洗淨，任其發酵充為肥

料。

壤土一半將苗木種入，繼

續壤土至離桶頂緣一~二公分

即可，然後將桶整齊的置放於

陽光不太強的樹下或北向的屋

簷下，如有蔭棚更佳。俟甦醒

後移置陽光充足處方可。

移入苗桶前應充分澆水，

以後亦應經常洒水，保持桶內

土壤適潤。放於陽光下後，自

二月至翌年三月間，南部為三月至五月間。掘穴依土盤大小略深三至五公分為宜，掘穴時表土分別放置，栽時表土先納入，心土後納入。然後充分澆水，以免土盤與穴土分離產生空隙影響成活。

栽培後管理：樟苗定植後，須立即用修剪鋸剪斷，桶內

如發現有根長出底部孔外，須立即用修剪鋸剪斷，桶內

如發現有根長出底部孔外，須立即用修剪鋸剪斷，桶內