

非洲紫葳花期甚長

邵淑平

非洲紫葳又名金鳳花，學名：Jacaranda Acutifolia (Mimosifolia), J. ovalifolia R. Br. 爲紫葳科。原產南非及南美洲中部。民國四九年由金陽鎬、楊西崑兩位先生引進種植於士林園藝所。

非洲紫葳爲常綠喬木，樹高約二、三丈，樹型似鳳凰木，很優美，極具觀賞價值。在本省北部栽植會有少許落葉，葉爲偶數羽狀重復葉，長約二九、三八公分，對生，青綠色，無光澤，葉柄基部呈扁圓形隆起，葉之主脈呈凹形，葉背淡綠色。新枝深綠色，老枝灰色有白色之皮目，平滑，略帶光澤，老幹粗糙呈龜裂狀。花着生於枝條先端，總狀花序，長約二五公分左右，花冠爲筒狀，藍紫色。盛開時全株皆是花朵，極爲秀麗美觀。花期甚長，五、十月適合盆栽、行道樹、庭園內種植，本省栽培不多。



非洲紫葳

非洲紫葳樹勢強健，無病虫害發生，耐旱性強，性喜高溫、乾燥之氣候。種植時需選擇日照充足、通風、排水良好之地，土壤以黏質壤土爲佳。

繁殖季節以春、秋兩季行播種或扦插法，繁殖前應先將苗床土壤中耕、打碎、拔除雜草。黏性高之土壤，宜行客土，搬運沙質土改良，使土壤鬆軟，將畦耙平，再行播種或扦插。

種子撒播於苗床後，覆蓋少許土壤及稻草將畦蓋好，可避免洒水及雨水之滴落，減少水分蒸發，保持溫度。扦插繁殖時，插穗之選擇以越年生發育充實，節間短之枝條，剪取三、四節長約二〇公分爲宜，以株距一五、二〇公分爲宜，斜插入土三分之一，用手將插穗四周土壤壓緊，充分澆水。

苗木在生育期間注意濕度，拔除雜草，成活可達九〇%。秋季繁殖之苗木應避免冬季之霜害，可用竹簾於晚間覆蓋。待苗木生長一尺許，此時即可移植苗圃或盆栽。

移植前亦需中耕、整地、去除雜草、作畦耙平，然後以株距四五公分左右挖穴，放置腐熟之堆肥或基肥二公升與土壤攪拌。將苗挖出剪去三分之一，放於穴中覆土，壓緊苗之四周土壤，充分澆水。

盆栽者宜先準備六寸花盆，用瓦片疊蓋底部之排水孔，需注意留空隙，以免種植後排水不良。裝入混合之培養土，將苗剪去三分之一放置盆中，壓緊四周土壤澆水。以後注意拔除雜草，施硫酸銨及花卉複合肥料，即會發育強壯開花供觀賞。



小蝦花宜室內盆栽

小蝦花學名爲

Acanthaceae Gul-lata, 英名爲Shrimp plant, 是爵床科植物。原生於墨西哥，高度約一八、二四英寸，葉卵形，柔軟而下垂，呈綠色。

長大的植株由四月到十二月，可繼續不斷的開出長達六英寸垂懸的穗狀花序，由不引人注意的白色花藏於吸引人的粉紅褐色下垂的苞片內所組成，形狀與蝦相似故名。

利用扦插法繁殖，每年三或四月切取二、三英寸長，半成熟的莖作插穗，插於置有等量泥炭與沙的盆中，保持溫度在攝氏一八度。如有必要須再換盆，通常在三

月種於五、六英寸盆中。

夏天置於室內，保持植物冷涼及通風良好，可使花期長久，如置於室外則須遮避強光。在五、十一月可經常澆水，保持土壤溼潤。

冬季最低溫度攝氏七度。過冬後剪定，將主莖切至底部，以保持植株形狀。幼株第一個開出的花須剪掉，避免養分太早消耗，以使植株健壯。

此種植物虫害少，但是當栽培環境不適，會引起生理不正常，葉片上長出黃或褐色斑點，植株低垂不振，且易受病菌侵入而腐爛。故應改善生長環境，在生長季節（五、九月）每周施用液肥於葉片上，以補充生長所需，善加照顧，可使植物恢復正常。（舒麗菊）