

# 羊蹄甲 · 花色鮮艷

林樹之

羊蹄甲屬蘇木料，學名是 *Bauhinia Purpurea* Linn，顧名思義其葉部像羊蹄甲而得名，或稱洋紫荊。花紫紅色而帶芳香，可栽作庭園及行道樹。

作庭園樹時，因樹型不大，栽植距離三至四公尺。花盛開時，顏色鮮艷綺麗。

羊蹄甲可作二、三等中小道路和海濱行道樹，二等道路寬七、八公尺，三等道路寬四、六公尺。栽作行道樹，炎熱夏季正是枝葉茂盛時節，可以遮擋炎陽。花盛開時，人行其間可聞花香。冬季正是花落果成時，葉呈稀疏現象，冬季和煦的陽光，照在行人的身上是很暖和的，是冬暖夏涼的樹木。

羊蹄甲通常用種子繁殖育苗。種子成熟後不必即行採摘，可任其在樹上，需要時隨時採下播種。如有空地可採用苗床播種，處理操作方法與一般樹木播種無異。也可用廢沙拉油鐵桶或奶粉罐，把桶和罐上部用開罐刀全部沿邊緣開啓，底部用粗釘打

孔五個以便排水。如採用培養土，應取壤土三分之一、堆肥三分之一、腐熟豬糞等三分之一混合。也可選用溝土，水溝內土看情形於使用前一、二天挖出涼乾，即可使用。如使用園土，須於前一天澆水，保持濕潤為度。

掛在樹上的種夾可用長竹桿打下或用高枝剪剪落，置曬場上或舖以席

或直接放在籃筐內，俟夾開裂，種子脫出，檢飽滿充實的播種。

選種前先除去莢皮等雜物，用風選和水選均可。風選可利用天然風力或其他方法將輕雜物除去。水選則把種子放在水桶中，飽滿充實的沉在水底，秕子浮在水面的傾出即可。

經選妥的種子可放在流動水中浸種，俟種子膨脹約本來的二倍時，即可立即播於預備的桶或罐內。覆土以種子直徑的二倍為度，稍作鎮壓，將桶罐排列整齊，以便管理。如多量育苗，應將桶罐排成一公尺許，中間留約三十公分步道以利澆水和除草等工作。

每桶播種子二粒，俟發芽後將弱小的一株拔除，拔時左手用食指和中指壓住健苗，右手拔除弱苗。如二苗距離稍遠則不用左手，右手直接拔除弱苗即可。

用廢桶罐育苗於草地之上或房簷之下均可（房簷下避免放在滴水處），有效利用空間，省却許多苗床上操作的麻煩手續。

另外尚可利用廢塑膠袋，如裝糞子或麵包袋均可處理利用。不過廢塑膠袋需事先長時間收集或儲備，通常廢塑膠袋底多屬封閉，故使用時必須剪開以利排水。

無論用廢鐵桶或奶粉罐和廢塑膠袋育苗，倘放置一處不動，苗根可自桶罐之孔或袋底長出新根，直入土中。此時生長突然旺盛，呈生長優勢現象，若聽其自然，則主根勢必甚長。

這種情形桶內側根會逐漸乾枯，栽植時極難成活。故每隔半個月或二十天，可將全部桶罐或塑膠袋移動一次，如有入土主根，自然截斷。如此抑制主根生長，可促進側根發達，定植時成活較易。

苗高達二十至三十公分，即可定植。鐵桶罐如果鏽的程度達鬆軟狀態，可直接用手撕破，否則須用鐵剪，剪開鐵桶罐，小心放入穴內。

掘穴時應將深根雜草連根除去，按照預定株行距，挖掘植穴，表土與心土分別放置，深約三十公分，直徑二十五公分為原則，稍深更佳。苗木納入植穴後，該先納入表土，後納入心土。覆土後即行澆水，以求苗木穩定。


苗距約三·五×三·五公尺。栽作行道樹，約每隔四公尺許栽植一株。沙拉油廢鐵桶及廢奶粉罐育成的幼苗成活率高，栽培季節亦不像苗圃育苗限制的那樣嚴格。可省却補植的手續。

羊蹄甲自然落在樹下的種子亦可成苗，此苗亦可直接栽植。如太小可移植於前述的廢鐵桶或罐內，俟生長高達二十至三十公分即可栽植。

直接自樹下掘取幼苗，要儘量避免損傷根部，栽植時須剪除全部葉子。樹下須苗，最好能擇降雨後土壤疏鬆適潤時，掘取後應立即栽

植，避免乾風吹襲時節。栽植時仍如前述掘穴法，將表心土分別放在穴旁，以便覆土。苗木納入穴中時較原苗木深一、二公分。當納入表土時，苗木稍向上提踏，以利苗根舒展，再納入心土然後踏實。苗木四周應作一圓圈，備儲雨水。栽後須充分澆水。利用廢鐵桶罐育苗，栽培季節雖然不受太嚴格的限制，但求樹木發育優良，栽培季節仍應予以考慮。羊蹄甲最好在雨季前栽植，台灣南部通常雨季自五月開始，所以於四月下旬栽種較適；北部雨季十月開始，所以九月下旬栽種較合適。

栽後要注意除草，以免陽光、水分、肥分被雜草掠奪。每年如能鬆土中耕一、二次尤佳。如土質較瘦，則需酌量施以堆肥或腐植土。



羊蹄甲