



狼尾草青儲

〔問〕：(一)我對狼尾草青儲程序與方法，仍不甚明瞭，所以不敢施行。如何做能使青儲容器中的狼尾草腐敗損失減至最低？(二)狼尾草是否須一年更新一次？

〔答〕：(一)狼尾草不可以施用雞鵝等糞便？(二)切狼尾草的小型切草機在何處有售？草切後營養成份是否會損失？

〔答〕：(一)天竺鼠是否可吃帶有雨水的草？如不能吃那麼連下數週雨該怎麼辦？(台北縣淡水鎮關渡埔頂自強路一〇二號施志強)

〔答〕：(一)狼尾草一般的青儲容器有青儲窖、青儲塔、青儲槽、青儲壕、塑膠青儲袋等。

狼尾草調製青儲草十分簡單，不論加不加糖蜜或其他添加料，都可以做成很好的青儲草，最簡單的方法如下：

(1)青儲草不要太老收刈，通常約一公尺高，或比一公尺稍高一些就要收刈，以確保品質。

(2)將狼尾草切短，要切成約一寸至一尺半的長度(可以使用動力切草機)。

(3)馬上裝填到青儲容器內，越快越好。每裝填六寸深的材料就要盡量踏緊，以便趕出空氣，減少呼吸及腐壞的損失。

(4)蓋塑膠布，為隔絕外來空氣，裝填完畢後，上面要覆蓋一張薄的塑膠布(不要用厚塑膠布)。

(5)塑膠布蓋好後，上面再蓋一層五至六寸厚的半乾碎土即可。如要防雨，上面可再蓋一層防雨的東西，或採用有頂蓋的青儲容器。

(6)調製狼尾草最重要的就是不要讓空氣進去，無須抽氣。另外，如果做比較高級的青儲草，如紫雲英等，可採用真空青儲草法。抽氣方法很簡單，就是將青儲草密封在青儲塑膠袋後，裝一個單向活塞。(空氣可以抽出來但是不會進去)把空氣抽出後，在單向活塞開口處，再用塑膠布封密即可。

(7)狼尾草不須要每年更新一次，如管理良好，到五年以後才更新。如每年要更新，表示種損及管理不良。草苗來源可向各縣(市)政府農林科畜產股(或建設局農林畜產課)接洽。各農業試驗所及畜產試驗所(包括試驗分所及各家畜繁殖場)均有牧草苗供應。為確保取得優良品種，不要向其他農民私自轉讓。

(8)狼尾草可用雞鵝肥。如數量足夠，不須施化學肥料，否則必須施用化學肥料補充。

(9)切草機到處有售，如果找不到，可向各縣政府農林科農務股查詢。草切後牧草本身營養不會損失，只是對家畜生理上會有影響。

(10)天竺鼠吃下帶有雨水的草易生病，常發生瀉症而死亡。應盡量避免吃帶生的水草。冬季連綿下雨，可用其他草料或稍許優良乾草補充。(林培旺)

猪互咬尾巴

〔問〕：(一)猪仔在二十公斤左右

，偶然會發生咬尾巴情形，這是何種病態？(二)如果發生咬尾巴的情形，應該如何處置？才不致繼續把尾巴咬的精光？

〔答〕：(一)幼猪剛跟母猪隔離一、二天後會發生互相咬吮肚臍情形。這是何種病態？(台南麻豆鎮油車里一四四號邱清涼)

〔答〕：(一)在狹欄中，關很多猪時，容易發生咬尾巴情形。

猪除了吃及睡覺外，就無事可做，相互逗玩相咬，尾巴及耳朵是最好咬的地方。

有時不小心咬的力量太大，就會受傷而流血，血液有鮮味，猪會圍過來吸流血，因此變成咬尾巴。

尤其自己配製飼料中可能會欠少鐵銅或其他礦物質時，猪會對血液很感興趣，而會成羣咬來咬去。

(二)有一頭猪尾巴被咬斷時，應立刻以細的鐵線將斷的地方縛好，並留下〇.五公分左右的斷端，一方面是止血，另一方面是利用鐵線的斷端，預防再咬。即咬的時候斷端會刺到口粘膜及舌頭以後就不敢再咬。

(三)剛離乳的小猪，尚有吃奶的習慣；想繼續吸乳，但母猪已隔離吸不到奶頭，只好吸吮其他猪的肚臍部，這不是病。(張聯欣)

