

蕎麥播種期

〔問〕：我們公司所經營的牧場，位於花蓮與台東之間（即長虹橋），海拔約二百公尺。請問在此地種植蕎麥，應該何時下種比較適合？（花蓮豐濱鄉港口村九六號曾治誠）

〔答〕：蕎麥一般多為秋作栽培，播種期為九月中旬至十一月中旬。如在水田裡作栽培時，第二期水稻收穫後，就應即時播種（大約十一月上、中旬），太晚播種產量低。

春作也可栽培，但品種不同，播種期為二月上旬至三月上旬，而且產量比秋作低，所以最好秋作。

春作：秋作各品種的平均產量為：春作：本島平在來及小國在來等品種，每公頃約產一、〇〇〇公斤左右。

秋作：高沙種，每公頃一、五〇〇至一、八〇〇公斤，諫早在來與鹿星在來等，每公頃一、二〇〇至一、三〇〇公斤。（林薰生）

寧蒙樹腐病

〔問〕：（寧蒙樹主幹基部樹皮滲流綠色透明樹膠（非星天牛為害），日久後患部樹皮腐爛，是否為腐爛病？

（我曾用大生和糊狀波爾多液塗治，但無效。請問該用何藥防治？）（屏東縣新埤鄉建功



村建功路九十六號張鏡湖）

〔答〕：（）腐爛病及流膠病均能使寧蒙主幹基部流膠。流膠後致樹皮腐爛，可能是屬於腐爛病。

（）患腐爛病樹株，須用利刀切除患部及周圍健全部位後，以多穗一對生石灰二〇的比率加水調成糊漿或糊狀波爾多液塗抹於切除部位，等乾燥後再塗上一層柏油，保護傷口。（以大生類或糊狀波爾多液塗抹樹皮，對本病防治不發生作用）。

病株被害部切除後，在該部位上方實施根接。（翁仁祿）

泡桐天牛防治


〔問〕：我在山坡地種有泡桐五、六年生，最近發現在高處（低處也有，比較少），多半在分枝處（五、八公尺），遭受天牛為害。嚴重的一棵被害數處，被害處外皮結有木屑，內有虫穴。請問：被害處均在很高地方，塗藥困難，應用何種方法防治？（斗六鎮平和街六一號鍾雪碧）

〔答〕：防治天牛為害，可於四、五月間天牛成虫產卵之前，應用五〇%地特靈 (Dieldrin W. P.) 可濕性粉劑一〇〇倍液，塗刷於樹幹周圍。

但來函既稱天牛被害處均在很高地方，所以塗刷地特靈似其困難，可改用二五%滅賜松乳劑 (Metasystox) 一〇〇倍液，只需塗刷於樹幹低處（約高一尺半）周圍即可。

滅賜松是滲透性藥劑，藥效能隨樹液上升，但此藥極毒，施藥時必須戴口罩與橡皮手套。原液尤須小心處理，不可觸及皮膚，以免中毒。（應之璘）

日本製 川本牌 家庭用自動幫浦



- ☑ 採用幫浦專用之強力高性能馬達。
- ☑ 吸水量強，機體構造精密，故障小，經久耐用。
- ☑ 利用井水，河川，溪流，水池水等，像一般家庭自來水般方便。

機種 N-130 吐出量每分16公升(全揚程12公尺)
N-200 吐出量每分22公升(全揚程12公尺)

沒自來水的地方，裝用給水有普通自來水一般的享受。不需水塔，電源開關一開，水源源流出。

◀ 原裝進口，歡迎選購 ▶

經銷處：新高貿易股份有限公司

台北市峨嵋街68號 電話：3314190・3713208 郵發台北市15195號

花、菜、果農友們的好消息
園藝專家和業餘愛花人士
都一致讚揚!!

園藝肥料 還是...

速效水溶性
花寶
HYPONE-X
ハイポネックス

長期持續性
魔肥
MAGAMP-K
マグアンプK

最安全、最有效!!

- 風行世界數十年的最優秀美國製綜合化學肥料。
- 全省各地蘭園、花店、種苗店均有出售。
- 樣品，說明書，訂購辦法來信即寄。

專營 世界名牌
台灣總代理
和園園藝企業股份有限公司
台北市士林區中正路104巷1弄2號

園藝 { 肥料
器材
藥劑

(玫瑰花推廣中心 同地址)
電話：831-3302・831-3086
郵政劃撥：101360號