



枝密集，短促，開花較晚。花期是自第一朵花開放算起。

(三) 受粉不完全的花所結果實，都將先後脫落。這種果實沒有種仁。結果過多，遇營養缺乏時，生長緩慢的正常果實，也會脫落。這些落果，都不會影響正常產量。值得重視的是，蛀虫為害的落果，必需在結果期間，每一○天噴一、○○○倍「力拔山」或「速滅松」一次，至果實採收前一星期停止。

(四) 早花、晚花，還不能用人工調節。(張振宙)

母猪死產

〔問〕：(一) 我在去年五月二十四日，由草屯農會買進一隻「洋一」品種母猪，並於十二月十一日交配，但未受孕。今年一月四日再交配，已受孕，應在四月底生產，但未生產。當時牠陰部紅腫，乳房腫大，且有少許乳汁分泌，最近逐漸收縮。請問是何原因？

(二) 我有兩隻黑仔二品種母猪，兩隻同在五月間生第二胎，產後均發現有一乳頭和乳房腫且硬，甚至影響食慾。是何原因？應如何防治？(南投草屯鎮碧山路一五六號陳昭益)

〔答〕：(一) 你的「洋一」母猪，胎兒已死在腹中，成爲死產。到預產期雖有分娩徵候，但不見生下仔豬，

現在胎兒慢慢被吸收，將來成爲木乃伊胎(黑仔)。如一直拖延，有時拖延二、三個月之久，不知何時才能排出。應請獸醫行人工分娩，早日將其排出，以便再配種較爲經濟。

普通發生死產的原因，多爲飼養管理不當，遺傳及疾病(多爲病毒性之傳染病如日本腦炎PPV)等等。

(二) 這二頭母猪可能得了急性單房性乳房炎。原因是乳頭乳房的傷口，感染化膿性細菌(鏈球菌，葡萄球菌及其他化膿菌)。乳頭乳房的傷口主要是因小豬出生後，未剪牙齒，吸乳時咬破乳頭房所引起，也可能是被豬舍中銳利的東西所割破的。

防治法：(1) 仔豬出生後，必需在剪臍帶的同時剪牙齒(上下顎之門齒)。(2) 分娩前，豬舍必需洗滌乾淨，並施行消毒，消除病原菌。

(3) 發生此病，應即時注射盤尼西林等抗生素治療。如果治療太慢，乳房可能化膿，要切開挑膿，或變成硬乳房乳腺萎病，將來不再泌乳。(張聯欣)

蓮霧提早開花

〔問〕：我種有七、八年生蓮霧樹百餘棵。都在三、四月間抽穗開花。請問：如何才能提早抽穗開花？(高雄市中正四路二五三號鍾天淵)

〔答〕：蓮霧在十二月間，在葉片噴三○○~四○○倍的第一燐酸加里。第一次噴過後，隔二星期再噴一次，促進提早休眠，可提早分化花芽。第一燐酸加里可向「高雄縣大湖新高種苗圃高其立先生」洽購。(張振宙)

樂敏牌

ROBIN

農業、產業機械之動力源


二衝程·四衝程

一馬力至二十馬力各馬力齊全

●強力 ●輕便 ●省油 ●耐用

兼售ROBIN汽油引擎發電機
RG10·RG15·RG20三種請賜洽

待望已久的柴油引擎已運到了!!



EY18-3B

製造元：富工重工業株式會社
經銷處：樂敏有限公司
台北市康定路18號4樓
TEL.3610740·3612045·3613541~3