鈴兒花清新脫俗

——應紹舜



台灣鈴兒花

鈴兒花屬於杜鵑花科落葉性灌木，分布於喜馬拉雅山麓及亞洲東部一帶，約有十種左右。

鈴兒花又名吊鐘花，據「植物名實圖考」記載「鈴兒花一名吊鐘花，生長廣東山澤間，歲暮葉脫始蕾，樵人折以入市插置瓶胆，春初花開，狀如小鈴，花落葉發。」，是以長久以來，我國即以鈴兒花視爲一種觀賞植物。

事實上，在我國東南各省人家中，除了以花姿艷麗，花期長久供瓶插外，在冬令時，亦有栽植爲室內盆景用，爲一甚爲脫俗的觀賞植物。

最近在台灣北部山地中，也發現了一新種的鈴兒花，花姿雅緻，清新脫俗，和我國東南各省所產者一樣，花是先葉而開發，花開之時，樹枝上長滿了上千朵像燈籠式的花朵，襯托着紅色的苞片，好看極了。在學術上，除了將這種新種植物命名爲台灣鈴兒花（Enkianthus taiwanianus Ying）。在經濟價植上，也有可能成爲一種具有開發潛力的觀賞樹木。因此，筆者特將鈴兒花的性狀、種類、台灣種發現的經過及栽培方法詳介於後，以供欲栽植者參考。

性狀：吊鐘花屬（Enkianthus）是杜鵑花科植物中的小屬，約有十種，多數爲落葉性，少數呈常綠性。枝條輪生，冬芽卵形，被有鱗片。葉互生，多叢生於枝條先端，有柄。花多在初春葉尚未長出來時開放，亦有少數種類跟葉芽同時開放。花小但數朵叢生一起，或呈總狀花序排列或繖形花序排列，白色或紅色。花萼片五枚，形狀極小。花冠呈鐘形或壺形，先端緊縮，淺五裂。雄蕊十枚，包被於花冠內，花藥的頂端具有刺芒二枚。果實爲蒴果，成熟後五瓣裂。種子一或數顆，呈三角或五角形，具有薄翅藉以達散布之功。

種類：①鈴兒花（Enkianthus quinqueflorus Lour.）—本種產於廣東及香港一帶，亦即是植物名實圖考中所稱的鈴兒花。呈灌木或小喬木狀，爲一般東南各省人家中栽植最普遍的一種。葉簇生於枝梢，橢圓形、長橢圓形或倒卵圓形，花呈粉紅色或深紅色，爲最艷麗的一種。

②齒緣鈴兒花（Enkianthus serrulatus Schneid）—本種產於我國四川、湖南、湖北及雲南等省的山地。和鈴兒花不同的是本種葉具有細鋸齒，花姿與前種相似，亦有人將此種列爲前者的一變種。

③小丁木（Enkianthus deflexa Schneid）—本種或稱四川鈴兒花，生長於四川瓦山，海拔約一、五〇〇～二、八〇〇公尺的高山上，花呈黃赤色繖形花狀的總狀花序排列，花冠呈鐘形，花期在五月。

④燈籠樹（Enkianthus Chinensis Franch）—產於湖北及四川一帶山地，亦稱貞楤，葉橢圓形或倒卵形，邊緣呈鈍狀小鋸齒，花紅色。

⑤燈台花（Enkianthus perulatus C.K. Schn）—產於日本四國、九州的山地，落葉灌木。花叢生於枝條先端，白色，下垂，花冠卵形，果實呈長橢圓形。本種在日本亦有種植於庭園中以供觀賞。

⑥紅花總狀鈴兒花（Enkianthus sernuus Benth et Hook）—產於日本本州西部、四國及九州一帶山地。花紅色，數枚呈下垂的總狀花序，花姿甚爲艷麗，爲日本庭園中栽培甚爲廣泛的一種鈴兒花。

⑦日本鈴兒花（Enkianthus campanulatus Nichols）—產於日本本州近畿一帶，花粉紅色，數枚呈下垂的總狀花序，花姿雅緻，已有不同的品種及變種出現，栽植亦多。


⑧綠花鈴兒花（Enkianthus subsessilis Makino）—本種亦產於日本，最大的特徵爲葉倒卵形，近似無柄。花於六～七月時開放，呈綠白色，也是下垂的總狀花序，花序的花軸上具有毛茸。


⑨台灣鈴兒花（Enkianthus taiwanianus Ying）—產於台灣北部山地，數量較爲稀少。花多在葉未長出前開放，乳白色，先端略帶有綠色，苞片呈紅色或粉紅色，相得益彰，爲一不可多得的觀賞植物。


台灣鈴兒花係由筆者首先發現，民國六十五年三月間，剛好是青年節及春假期間，筆者乃約同森林系二年級同學等三人共同攀登北插天山採集植物標本。在接近多崖山頂附近約海拔一、六〇〇公尺的地區，發現有一種開花非常艷麗的樹木，根據筆者多年來採集植物標本的經驗，雖知爲杜鵑花科的植物，但屬於那一種則不知道，除採集大量此類標本外，並拍下彩色照片以供參考。

走過多崖山後，在多崖山及北插天山間的鞍部上，又有這種植物稀疏









上：三色菫　下：石竹　　（鮮聰賢攝影）　　上：玫瑰　下：睡蓮

地散生在較平坦的谷地裡。總計在這裡生長的台灣鈴兒花，不會超過二十棵。

此地森林的特色，爲台灣少數山毛櫸生長的地方，台灣鈴兒花則生長於山毛櫸森林邊緣，相伴而生的樹木有白花八角、厚皮香等闊葉樹木。

筆者採了大量此類標本，返回台大森林系，對照所拍得彩色照片，並將花仔細解剖，鑑定爲一種新的鈴兒花，乃命名爲台灣鈴兒花或稱爲台灣吊鐘花。

栽培方法：台灣鈴兒花由於係最近所發現，尚未作栽植試驗，故栽植方法尚難列出。不過根據我國東南沿海廣東一帶栽植鈴兒花的情形，列出資料以供讀者參考。

鈴兒花可用播種及插條繁殖。播種繁殖一般採春播，將種子播於沙質壤土中，俟發芽後，苗木成長一年於來春移植。亦可施行直播法，將種子直接播於欲種植的土地上。

插條法則取老枝條，略加修剪後，最好塗沫促進生根的生長劑於切口，斜插於沙質土壤中，一般在秋季葉落後行之。插條苗必須在苗床上生長一年後，始能移植。

鈴兒花須排水良好的地方始能獲致好的發育，尤其在多腐植土中發育最好，偶而亦能在鹼性土壤中生長。至於積水的酸性土壤，則不適。

由於台灣地處亞熱帶，台灣鈴兒花生長於北部一、三〇〇～一、六〇〇公尺間。因此，對平地的適應性尚不得而知，或許生長於蔭涼少見日光處能獲致良好的發育。陽明山、烏來及其他觀光地方由於海拔度高，一定適宜這種觀賞植物的生長。