

苧麻新品種

〔問〕：㈠推廣中苧麻「佐久間」種子何處有售？㈡應如何栽培。（北縣鶯歌鎮尖山路一〇一巷一八號徐瑞洪）

〔答〕：㈠苧麻「佐久間」種子台東農業改良場有售，暫定每公斤一五元，有意中購者，請將種子費以滙票交寄（外埠另請加上包裹郵資），很快可收到種子。

㈡苧麻栽培：

1.播種期：北部栽培適期爲九月中下旬。

2.播種量：平地每公頃十公斤，山地視坡度大小土壤肥瘠酌予增減。

3.行株距：行距一・五公尺左右，株距一～一・五公尺。

4.施肥量：每公頃施用一〇、〇〇〇～一五、〇〇〇公斤堆肥。追肥每公頃硫銨二〇〇公斤、過磷酸鈣二五〇公斤、氯化鉀五〇公斤。平地於播後二個月施用一次。山地分兩次，第一次爲播後四十天，第二次爲第一次施肥後三十天，用量可酌予提高。（台東區農業改良場雜糧股）

無子番石榴

〔問〕：據說從秘魯引進的「無子蜜拔」（無子番石榴），現已栽培成功。我很想種植。請問何處可購得種苗。（南投縣埔里鎮合成里西安路二三六號陳金昌）

〔答〕：無子番石榴種苗請逕向「彰化縣永靖鄉五福村中山路二四號農友種苗園」洽購。

目前永靖一帶所繁殖的無子番石榴，食味確屬優良，缺點是開花後容易落果，所以產量低。尤以在肥力不足的土壤生長者，產量更差。另一缺點是果形不整齊，有欠美觀。其中有一種，具有少數種子，結果較正常。

台灣早年即曾種植無子番石榴，因產量太差，未能發展。（張振宙）

蝸牛養殖

〔問〕：㈠蝸牛應如何飼養？㈡省產何種蝸牛可供食用？㈢蝸牛生活習性如何？㈣蝸牛肉有否外銷？以何國爲主？（宜蘭縣冬山鄉廣興村五二號陳清池）

〔答〕：㈠飼養蝸牛並不怎麼困難。過去省農業試驗所飼養過，在潮濕之地，供以果皮、蔬菜、米糠等飼料。最重要的必須防逃。

㈡蝸牛種類有數種，目前供食用或製罐用的是非洲大蝸牛（Achatina fulica）。

㈢非洲蝸牛一年繁殖一代，性喜高溫多濕。一般生活在田野間，喜食菜類、甘藷等較嫩作物。白天藏匿石塊田岸水溝雜草繁茂處，夜晚出現爲害農作物。

㈣蝸牛肉製罐外銷以歐洲爲主，如法國等。本省多由食品罐頭工廠自行收集製罐外銷。（張良傳）

福壽魚繁殖

〔問〕：㈠供魚苗吃的浮游生物應如何繁殖？有無他物可代替？㈡如何利用池塘在冬季繁殖福壽魚苗？（高雄縣茄萣鄉萬福村一段三九〇號李金城）

〔答〕：㈠一般浮游生物可在養鰻池中撈集。如要自行培養，須先將池水排乾，用石灰消毒，投放基肥，曝晒後注水，就會大量繁殖。可以絲蚯蚓爲代替餌料。

㈡將選種後的種魚，放養於具有防風設備的池中，並注入地下水，以防水溫低降。同時適量投餌，即會繁殖。不過在冬季繁殖量不如四～七月間那樣多。（余廷基）

產卵雞管理

〔問〕：㈠生蛋雞爲何常將蛋吞食，有何方法補救？

㈡生蛋雞常有互啄至出血死亡，原因何在？

㈢生蛋雞在管理上須注意那些事項？（台中縣太平鄉黃竹村中山巷二〇～一號劉和純）

〔答〕：㈠產卵雞吞食自己生的蛋，應設法每隔二小時檢蛋一次，並在雞舍內舖粗糠或切短的稻草和木屑等，減少破蛋來防止



㈡光線過强，或飼養太密，活動範圍太窄，會發生啄毛現象。因此需設法防日晒，並將飼養面積擴大。遇有出血，應擦碘酒治療。隔開飼養，以降低蛋白質與熱能比率也可防止。

㈢產卵雞管理應注意下列問題：1.調配平衡的蛋雞飼料。2.飼料糟內一天喂二～三次飼料，每次飼喂時應攪平飼料，飼料量不宜超過飼槽三分之一以上，以減少飼料損耗。3.經常供應乾淨的水。4.隨時淘汰劣雞。5.防止過熱或過冷。6.注意點燈技術，提高產蛋。7.定期實施預防注射，隨時留意雞採食飼料情形。8.不斷研究，與同行檢討經營得失，隨時改善。遇有困難時，與貴地農會或公所獸醫聯絡。9.保持紀錄，做爲改善的參考資料。10多產雞較神經質，進入場內保持安靜，不要多加驚擾。11保持雞舍清潔衞生。（唐清岑）

竹筍施肥

〔問〕：㈠在虎尾平地，PH八旱田，要不要施用矽酸鈣？

㈡生產竹筍，應如何施肥？

㈢將水溶性化學肥料直接投入灌溉水中施用，有何利弊？

㈣爲何麻竹產筍會有枝數多，筍形小的情形發生？

㈤如何防治麻竹綿蚜虫及黑刺蛾爲害？（雲林縣虎尾鎮中山路三〇號鄭綢）

〔答〕：㈠碱性土壤缺乏微量元素，作物生育受阻，所以PH八的土壤，不宜再施用矽酸鈣。

㈡竹筍施肥時期在每年二月起～八月，一年分三～五次，配合下雨或灌溉後施肥效果較大。麻竹每年每壕

目地更變法依地耕
止中之隨約契賃租

台北縣鶯歌鎮中正三路七鄰鄭厝十四號鄭建俊先生問：

㈠甲、乙、丙、丁、戊爲親屬關係，共有三十多筆田地，迄今尚未分割。

民國五十二年葛樂禮颱風肆虐，將土地表層全部冲走，不能耕種，乃於同年向地政機關請准變更地目爲「原」。現有人要買這些地，經多次協商，甲乙丙丁皆同意，戊堅持不肯。前四人是否可訴請法院强制分割？

㈡某甲之父，出租田地數筆給某乙，並訂有三七五租約，但因受五十二年颱風冲失，全部不能耕種，而變更地目爲「原」以後，乙均未付租給甲父。現甲父已逝世多年，甲已取得該地所有權，請問甲可否收回該土地，應如何辦理？

本社轉請高瑞錞律師答覆：

㈠政府爲擴大農場經營規模，防止農地細分，於農業發展條例第二二條上段規定「現有之每宗耕地不得分割及移轉爲共有」。

但來函所指土地，已非耕地。甲、乙、丙、丁可依民法第八二三條第一項、八二四條第二項，訴請法院裁判分割，而後出售。

㈡租賃物全部滅失時，租賃契約當然中止（民法第二六六條）。

本件情形如爲不定期限耕地租約，某甲並得依土地法第一四條第四款「耕地依法變更其使用時」得終止租約的規定，收回該項土地。

• • •

屏東縣萬丹鄉社皮村五十三之五號林岳先生問：

我所耕作一塊七則〇・四一〇〇公頃田地，交通不便，適有毗鄰一塊路邊田地〇・五五〇〇公頃要賣。我想把自己土地賣出，買進這塊鄰地。

但到地政事務所閱覽結果，發現土地登記簿上，我的土地跟鄰地的地號剛好弄反。我的應該是四五六地號，却登記爲四五六之二。鄰地應該是四五六之二地號，却登記爲四五六。去（六四）年十二月，我已向地政事務所申請更正，迄無結果，請問如何辦理？



本社轉請高瑞錞律師答覆：

利害關係人於土地登記完畢後，發現登記錯誤或遺漏時，得以書面聲請該管上級機關查明核准後，更正之。

此點土地法第六九條甚明。你可檢附土地所有權狀、田賦稅單及其他証據資料，以書面逕向縣政府聲請查明核准後，交由該管地政事務所更正錯誤。

漏遺誤錯記登地土
正更請申府縣向可



施用尿素一・八公斤，過磷酸鈣三・〇公斤，氯化鉀一・二公斤及矽酸鈣二・六公斤。或施用台肥五號（一六～八～一二）複合肥料四～五公斤及矽酸鈣二～三公斤。並依竹筍產量及竹齡酌量增減。施肥法用環施或條施，施後蓋土。矽酸鈣須與三要素肥料配合施用才有效。

㈢優點爲容易吸收，缺點爲容易流失及污染。

㈣麻竹筍產生支數多而筍形小，原因有下列二種：

(1)本省麻竹（H）品系卽爲產筍支數多而筍形細小。

(2)如施多量氮肥或土壤含氮過多，也容易加速發生支數多及筍形細小的現象。

㈤防治麻竹綿蚜虫可用五〇%「馬拉松」或二五%「滅賜松」（米賜多愛）一、〇〇〇倍藥液，以噴霧器噴施，比用粉劑裝於紗布內散布更爲方便省工。黑刺蛾可散布一・五%「賽文」（加保利粉劑）防治。（林維治・程煒兒・張玉珍）

新城雞瘟後遺症

〔問〕：我們的牧場飼養雞種有色肉雞，每批一千隻，共買進兩批，每批養到五～六周時，卽有數隻發生頸子向後轉約九十度以上，不能站立。狀似頸部抽筋，据說是屬於新城雞瘟後遺症。

請問：實際是何病症？應如何防治？（花蓮縣豐濱鄉港口村一三二號曾治誠）

〔答〕：染患新城雞瘟的病雞，經過三～五日不死者，於發病末期易呈現頭頸部痙攣或捻轉，脚麻痺而致不能站立或發生旋廻運動等神經症狀。此爲新城雞瘟後遺症，應迅卽採取防止蔓延措施。立卽撲殺深埋所有病雞，消毒所有器具。預防對策：

㈠斷絕病毒入侵，謝絕參觀，防止麻雀、老鼠入侵，雞舍內外保持淸潔，避免密飼。雞的移動與飼料搬運，需嚴防病毒侵入。

㈡預防注射（肉雞的預防接種計畫）：

四日齡與三十日齡時：皆須接種活毒疫苗一劑量，點鼻、點眼或飲水投與（接種後，連續三天投與泰徽素Tylosin）。

預防疫苗應購用新鮮而且保存情形良好者（注意有效期間），台北縣淡水鎮台灣省衞生試驗所有售本病疫苗。治療常無效果，但佳力黴素可緩和病情惡化。（唐淸岑）

提早茭白筍抽穗

〔問〕：本地所種的水筍，通常比外地晚抽穗。請問應如何處理才能提早抽穗生筍？（南投縣魚池鄉山楂腳巷二十九號劉進德）

〔答〕：茭白筍（水筍）出筍的早晚，與品種關係最大，次與氣候有關。如欲提早抽穗須：

1.栽培早生品種，例如青壳、花壳。

2.加强施肥管理，促進生育。例如多施堆肥及保持十五公分深度水量，最爲重要。（王進生）