



鳳梨栽培

注意採苗・種苗處理

・王武彰・

鳳梨栽培，除了選拔優良種苗外，最重要的為種苗的採集與處理，此與成果關係至為密切。這項工作近年來一般果農因受農村勞力缺乏及工資昂貴影響而大都忽略不甚重視，以致在成長中的病虫害由局部擴展至全面，得不償失。

為求鳳梨種植後，生長順利，達到產量高品質佳的境域，必須培育出生長強健，發育旺盛植株，所以在鳳梨種植前，採苗及種苗處理不得不特別注意。

處理不當的為害

鳳梨萎凋病、心腐病及苗腐病的發生，大都由於採苗工作疏忽與病虫害防治不徹底所引起。如中

置，以免混雜而影響生長。

(一)採苗後，應立即包裝運輸。到達種植地即宜排列，切不可任其堆置。

(二)需遠運者應使苗體保持乾燥，並避免搬運者

部地區及雲嘉地區，六四年秋植契作推廣園發生普遍且嚴重，果農叫苦連天，甚至部份為害率高達九〇%，損失慘重。

究其原因，除了種植方法不適外，採苗方法不當與種苗處理工作疏忽也是主要原因之一。

如何採苗

鳳梨採苗工作，應格外注意。假如採苗工作在雨天進行，葉片充分吸收水分，葉肉脆嫩易損傷，因此採苗須在晴天進行。

操作時須緊握苗基部採摘，不要僅捉葉梢尾端，以免心葉抽出受傷，病菌由傷口侵入引起腐爛。

種苗處理

鳳梨果實採收後，將各植株繁殖體摘取，種苗必須注意下列幾點：

(一)如留冠芽種植時，應在果實成熟採收時，把冠芽摘取，倒置於母株上，待傷口癒合時，再收集。

裔芽苗摘後，應集中倒置，排列在高處無積水清潔的地方。不同芽體分別放

在上面踏壓，以免生熱腐爛。途中不可受潮，注意通風。

(二)苗基部小瘤應於種植前切除，切口曬乾，以防引起病害。

(三)種苗如為吸芽，應剷除其部木質部，以利發根，葉片過長時，保留三六公分長，其餘剷除，以利種植。

(四)種苗為防粉介壳虫及心腐病，宜用四七%巴拉松乳劑稀釋二、〇〇〇倍，另加五〇%蓋普丹或八〇%四氣丹可濕性粉劑四〇〇倍稀釋液，浸漬三分鐘。

待藥液流盡後，將苗倒置於通風良好高地，一周後，才可種植。

鳳梨粉介壳虫防治

(一)鳳梨粉介壳虫最好的防治法，是種苗浸藥消毒後種植。

種植後，再用灌藥方法防治較為徹底。噴藥雖有效，但效果較差，因為藥量不集中。

鳳梨粉介壳虫防治藥劑以四七%「巴拉松」最有效。如粉介壳虫寄生在果實時，可用「力拔山」直接噴射在粉介壳虫身上。

(二)土壤中的粉介壳虫，不僅寄生鳳梨老莖，也會寄生在其他雜草根節，如土香草、稻草等，所以應提早犁耕整地，使所有雜物充分腐爛，可消除粉介壳虫，不必散布藥劑。

(三)螞蟥誘殺劑(滅蟻樂)請向鳳梨改進委員會農務處各原料區洽購。七五〇公克裝每包八〇元，三〇〇公克裝每包三五元。

・黃榮瑞・

