


鴿子外寄生蟲的防治



鴿子的寄生蟲比較容易看出。寄生蟲有內寄生蟲及外寄生蟲。爲了實用關係，現在先介紹外寄生蟲。

虱子

虱子共有五種，其中有三種比較普通。計有：
Columbicola columbae (Linn.); *Hohorstiella lata* (Piguet); *Corpocephalum binatum* (Denny); *Coloceras danicorn* (Nitzsch); *Menopon longicephalum* (Wood) 等。以前面三種較爲普通。

虱子，可以說有鴿子就有它，除非鴿場的主人，花了很多精神去除蟲，否則就一定可以看得到的存在。但鴿子的虱子並不吸血，爲害不大。虱子主要寄生在羽毛上，吃脫落的皮膚角質，羽毛及從體表滲脂。不過如果寄生太多還是會引起麻煩。

虱子形態特徵與其他的寄生蟲有很明顯的區別，它是屬於昆蟲類，身體可畫分爲頭部、胸部及腹部。胸部有三對腳，身體扁平，沒有翅膀，蛋小，附着於羽毛。

虱子的一生並不離開鴿子的身體，如果要離開鴿子的身體，即是從這一隻鴿子移動到另外一隻鴿子的身體上的。虱蛋在產下後十~十四天孵化，孵化後在十四天（兩星期）左右成熟。

防治虱子可以使用氟化鈉（氟化鉀）粉防治很有效。氟化鈉粉可以在藥房買到，可以使用五%粉末撒在腹部、翅膀內部及頸下部。

也可以使用溶液浸鴿子（藥浴），但是比較麻煩。各用一英兩（約二十八公分）或以台兩計算七錢。

半）的氟化鈉及普通肥皂和一加侖的水（四公升）混合後浸泡鴿子，可是這種方法會使鴿子有半小時左右不能飛行，會引起麻煩。

用硫酸尼可丁的一千倍溶液點滴在腹部，兩翅內面各點一滴也有驅蟲的效果。使用點滴的罐子來點滴也很方便。

但是硫酸尼可丁比較不容易買到，是其缺點。不過到藥局請藥劑師泡好千倍溶液，如果告知用途，應該是買得到的。
驅虱應每隔兩星期做三次~四次，才會完全見效。

壁虱・羽壁虱

壁虱和羽壁虱屬於蜘蛛目，還有很多同類。有一些是內寄生蟲。它有四對腳，沒有分開的頭部。很多人忽視壁虱的爲害，因爲壁虱晝伏夜行，且羽壁虱太小。事實上它們會吸血，又可能成爲病毒，細菌的傳播者。

黃暉煌

壁虱的台語名稱是「雞台」，在母雞抱蛋時特別多，這是一種很討厭的寄生蟲，當你碰到母雞抱蛋的窩巢會搞得滿手都是，不趕緊弄掉時會爬得滿身都是，不是滋味。現在大多採用人工孵化，「雞台」的發生比較少了。

壁虱可以不吃東西而活很久，不過它沒有吸血就不會產蛋繁殖。壁虱身體很小，小到不注意時就看不見。當它吸血之後，身體體變爲深紫紅色，那就看得見了。

雖然它的身體很小，但是行動非常的快，尤其要附着到另外的宿主的速度是驚人的。我曾經用手碰了一下雞窩，只是輕輕一碰就放開，結果滿手已有上百隻的「雞台」的經驗。

通常沒有特別多的時候，它們是躲在鴿舍，巢箱的隙縫裡，晚間才出來活動。厲害的時候，會使種鴿放棄孵化的工作。

壁虱與前述的虱子完全不一樣，它不會受到氟化鈉（氟化鉀）的影響。壁虱常住在很隱蔽的地方，日間通常看不見，晚間才爬出來吸血。

如果白天看到少數壁虱的話，已經很嚴重了，可能有上千上萬的壁虱在隙縫、巢箱（特別在巢板的下面）。因此發現壁虱的方法是晚間利用手電筒的光來看。如有壁虱，整個鴿羣不會興旺，繁殖不會很快，它的害處可以想像得到。（未完・下期續）

上下為虱子的放大圖

