


# 鴿子外寄生蟲的防治

## 黃暉煌

續26卷21期



在國外有殺死鴿子專用的塗料，我們的市場上沒有。

以前可以使用DDT，但是現在在DDT已經禁用。所以現在只能使用的是煤油的撒布或塗抹，撒在鴿舍及巢箱上，不是撒在鴿子的身上。


撒布之前，五天以上的乳鴿大概不會受影響。少於五日齡的乳鴿會有問題，可用罐頭的空罐蓋在小乳鴿上面，再撒布。壁虱在撒藥時會逃到地面上，等藥氣散去之後再爬回來。因此地面也要在撒藥之後清掃。巢箱內的墊草也一齊拿到遠一點的地方燒掉。裝東西的容器也要用驅除劑撒布，這是很麻煩的工作。

羽壁虱為害似並不大，不驅除也不會有问题，如想驅除，也可以使用煤油點滴在身上。

### 壁虱類

鴿子的疥癬可由Knemidokoptes laevis var. gallinae 引起。這種壁虱可以使羽軸在皮膚的上方斷裂，因形成極似疥癬的症狀。與此相似的疾病有啄毛，與過分強壯的公鴿配對的母鴿，飼料槽過高，以致頸前方的羽毛磨損等情形。需與疥癬判別，患部塗上水銀軟膏有效。

俗名「蟬」，吸血之後形狀如寬麻子的寄生蟲的學名叫做 Argas munitatus koch。這種「蟬」原來在雞發生，現在好在台灣尚未看到。



鴿子外寄生蟲繁殖危害情形

美國南部佛羅利達州、加利福尼亞州則常見到。臭虫也會危害鴿子。這種寄生蟲只在老一輩的鴿友有印像。從DDT及BHC的應用以來，已經有三十年看不到這種害蟲了。

### 鴿蠅


鴿蠅在世界上好多地方有，在本省尚未發現。鴿蠅會吸血，尤其對乳鴿的影響很厲害。它的身體比家蠅稍為小一點，它的特點是每次只產一個蛋，在母蠅體內孵化，幼虫在母蠅體內變為蛹以後才產下來。開始是透明，但是不久就變黑。其顏色可黑到和煤炭一樣。鴿蠅可使用一般的殺虫劑驅除。

### 蚊子


蚊子可以帶很多疾病。鴿子成熟時，皮膚露出的部分較少，但是眼臉、腳、頸及肉髯仍然會受到侵襲。乳鴿如沒有被母鴿抱住時，即很容易被蚊子叮咬。據說在泰國，二星期左右大小的乳鴿被蚊子咬到變形，種鴿雖不變形，但嚴重時會使繁殖停止。

蚊子除咬傷和吸血引起困擾之外，可帶給鴿子的疾病至少有：鴿痘、馬腦炎、瘧疾及絲狀虫（一種內寄生虫）。

其他還有很多蒼蠅的種類，因為它並不吸血，影響的程度並不大，在這裡似並不很重要。不過一個鴿場，如果蒼蠅多的話，可以表示清潔的工作還沒有做得完全，應加強鴿舍的環境衛生清潔。



受外寄生虫侵襲的鴿子羽毛



被蚊子咬破的羽毛