

在莖葉大部分黃枯時收量最高，這時匍枝已枯萎，易和塊莖脫離，外皮也較堅厚不易擦破，收穫後也較能耐儲藏。

如莖葉全部枯死後收穫，塊莖中所含澱粉含量稍減，較不耐儲藏。

在莖葉枯黃前如進入雨季，或有過雨浸水之處時，宜提早收穫。

採收時宜選擇晴天土壤乾燥時，小心掘取薯塊，掘起後在田間風乾，待薯面無濕氣時運至室內儲藏。

如在土壤濕潤時必須收穫者，掘起後必須數開，使塊莖風乾或陰乾後才包裝或儲藏。

(2) 儲藏：馬鈴薯為耐儲藏的蔬菜，收穫後視市場需要陸續出售，以獲得較高的利潤。馬鈴薯儲藏時，應注意事項如下：

(一) 馬鈴薯在儲藏前必須乾燥。
(二) 選無病虫害、無損傷的健全薯。

(三) 儲藏場所宜選通風冷涼、乾燥、清潔、無日光直射的地方。
(四) 運回屋內的馬鈴薯不可堆積太高。

(五) 採收搬運操作宜小心，避免損傷。

(六) 馬鈴薯塊莖經陽光或燈光照射後表皮綠化，影响外觀和品質，因此須儲藏於黑暗處或用草席等遮光。

(七) 注意老鼠、蟑螂、粉介壳虫、蚜虫等為害。

(八) 儲藏期間按期檢查，除去

腐爛薯，以免傳染。

注意防治病虫害

毒素病：①選購無病的保證薯。

②生育期間拔除病害株及防除蚜虫，以免傳染毒素。

晚疫病：

①栽培抗病品種。②嚴選無病薯。③生育期噴磷乃浦或錳乃浦四〇〇倍液預防。用七五〇四氣異苯肼可濕性粉劑（大克病）或蓋普丹噴撒。

瘡痂病：①實行輪栽。②嚴選無病薯。

③種薯消毒。

④調節土壤酸鹼度在五、六之間。

黑痣病：①選擇無病種薯。②種薯消毒。③土壤不宜過濕。④實行輪栽。

虫害：馬鈴薯在本省虫害較少，防治較容易。

切根虫（夜盜虫）、蚜虫：①防治地下害虫藥劑（如好年冬、大西通等）於種植時混合

三要素肥料施用，一分地約三、四公

斤。

②噴射安殺番一、〇〇〇倍。

③噴射五〇〇%馬拉松乳劑一、〇〇〇倍。

〇〇倍。

一畦二行式栽培


一畦二行式栽培（如左圖）

①田埂邊可做單行式栽培。

②肥料集中施於種塊兩側，可使初期幼根即時就能吸取養分，以助初期發育。

③以稻頭六株式耕耘整地法，四株做畦面，二株做畦溝。

④做畦溝方法：整地後畦面種塊經小覆土施肥後，以雙面犁從二株中的土壤取起來做大覆土。



美國原裝進口最新型濃縮液體混合肥料

農藥(水稻、果樹、茶樹、蔬菜類……) + 培蘭多液 = 節省人工、增加產量、提高品質。

北市建三肥字第065號

農林廳肥料登記證 農肥字第0134號



您的理想就是我們的目標……

培蘭多液 為農友及園藝栽培愛好者 提供更完美的服務!!

培蘭多液

LIQUID | PLANT FOOD

10-10-10

原製造廠：美國培蘭多化學公司 榮譽出品

總代理：旭浩企業股份有限公司

總公司：台北市民生東路990巷百樂大廈B座205室 電話：(02)761-7221

苗栗連絡處：苗栗鎮中正路834號 電話：(037)321203 ※說明書備索/