



蓮霧抽梢

〔問〕：(1)蓮霧多在何時抽梢？
(2)蓮霧應在何時行修剪？如何修剪？

〔答〕：(1)蓮霧一年內應抽幾次新梢才算正常？
(2)蓮霧應如何施肥？三要素比例如何？

〔問〕：蓮霧何時抽的新梢開花最好？老枝條(二年以上)應如何處理才能抽花芽，開花結果？(宜蘭縣羅東鎮中山西路二二六號之一鍾清水)

〔答〕：(1)果樹抽梢，以春季為主，其他時期視雨水與土壤肥沃度而定。

(2)常綠果樹宜在採果後修剪，落葉果樹宜在落葉期修剪。常綠果樹修剪對象為：(1)樹冠內部受光不良小枝(2)衰弱小枝(3)過密小枝(4)病蟲害小枝(5)枯枝。

(3)果樹抽梢次數，與生長勢有關。以春梢最重要，其他時期抽梢，無關重要。

(4)果樹以開花前一個月施肥，最

為重要，其他時期，如非生長衰弱，可以不施。三要素比例為一：一：一。

(2)任何果樹，以春梢開花最好，老枝條如需剪短，可在採果後修剪。(張振甫)

雜草香附子防治

〔問〕：(1)「陶本斯」(Down-Pou-S)是否對香附子有斬草除根的功效？

(2)「二、四-D 鈉鹽」殺除香附子的功效如何？應向何處購買？(虎尾中山路三〇號鄭緝)

〔答〕：(1)「陶本斯」對香附子有殺除效果，但不是施藥一次即可「斬草除根」，須連續施用三~四次才可以完全控制。

(2)「陶本斯」殘效性較長，大約有二~三個月，所以施用後須經過一段時期，才可栽植作物(甘蔗除外)。

(3)「二、四-D 鈉鹽」對香附子的效果亦同，須連續施用幾次才有效。省產「二、四-D 鈉鹽」，以臺灣糖農化廠出品者較可靠。(林寶鑫)

私稻品種

〔問〕：(1)台中二二號是否可作宿根栽培？

(2)台中二二號自播秧至成熟約需幾天？

(3)土名叫暹羅種正名為何？有何特性？

(4)菠菜專業栽培，在收穫前數天，施用加入激勃素的尿素液能促進葉的伸長。請問應用何種激勃素？(彰化伸港鄉泉厝村九八號周重毅)

〔答〕：(1)台中二二號再生力屬中上，較強者有草屯「IR 8」及台中在來一號。

(2)台中二二號一期作本田生育日數一四四天，二期作九五天。

(3)一般農友所謂「暹羅種」均指長秈稻，粒型細長，分蘗數較多，產量高。其中尤以最近育成命名的台中二二號，不但產量特高(通常在六〇〇〇~一〇〇〇〇公斤/公頃)，米質又好，抗病蟲害均在抗以上。但較怕冷，故一期作不宜過早，二期作不宜過晚種植，尤適於在肥沃土壤栽培。稻種可向彰化縣花壇或秀水農會申請。(張學現)

(4)菠菜使用的生長素為 Gibberelline，目前在本省使用的有兩種：1.日本製三·一%「激勃素」可濕性粉劑每公頃使用一公斤三〇〇~六〇〇倍。

2.英國製一〇%「激勃素」片劑使用六、〇〇〇~一〇、〇〇〇倍，連續使用二~三次。(林嘉興)

柑桔蒂枯

〔問〕：我種植的八年生甜橙，歷年結果繁豐，但今年發生「乾蒂」現象，即接果蒂處的小果枝，在約一公分長處變成枯枝，果實脫落。也有不脫落，但果實變為乾軟。是何原因？應如何防治？(嘉義市忠義街九號曾昆烟)

〔答〕：樹勢較弱，通風不佳，日照不良的柑桔樹，易發生蒂枯現象。請加以適當修剪，改良環境，並加施肥料，促進樹液循環。

噴射「二、四-D」20 PPM (五萬分之一)可防止蒂枯現象，但須

注意稀水倍數，以免發生藥害。(翁仁祿)

豆類人工授粉

〔問〕：我對西瓜、胡瓜及蔬菜用豆類育種工作頗感興趣。但對豆類交配工作感到困難，因不能分辨豆類雌花雄花。豆類應如何行人工授粉？


(2)過去我曾育成一種珍奇罕見的黃皮小型西瓜，品質外觀均佳，但因原種被老鼠吃掉，無法繼續繁殖，我計畫重新交配、分離、馴化等研究工作。何處有售黃皮西瓜種子？

(3)秋水仙素及秋水仙精是否同一種藥劑？有何用途？(屏東高樹鄉南村與店路二〇~三〇號黃福一)

〔答〕：(1)豆類的花為龍瓣花，是兩性花，且雌蕊先熟。除雄須在開花前兩天行之，過早會使柱頭乾萎，過遲，自交的可能性高，據我在菜豆育種的經驗於二日前除雄，再於翌日(開花前一天)上午九~一〇時實施授粉為佳。所以須以花蕾的着色度來判定開花日。

除雄時用錘子剖開花蕾花瓣除去龍骨瓣內所有花絲，同時不可傷及柱頭。

授粉時，採用自然開的花粉輕輕地塗敷在經除雄的柱頭上，授粉後，再用 Haro Corn Syrup 4分 Glycerin 1分混合調和，加入 Parachloro Pheny acid 作成 Indol butyric acid飽和液，置於三七~七度C



權

台中縣霧峯鄉桐林
村民生路三四二號陳鳳
陣先生問：

某甲將房屋一棟無
償借給某乙居住，某乙
竟暗中將房屋一半出賣
與某丙，得款新台幣五
萬多元，飽入私囊。某
丙公然向某甲要印鑑證明，以便過
戶，甲當然不給。請問某乙觸犯何
罪？甲乙二人誼屬姻親，某甲不忍
立即採取法律行動，但多方協調，
仍無結果，現已經過一年多，是否
已喪失追訴權？

本社轉請高瑞
錚律師答覆：
不動產無論是
房屋或土地，都只
有所有權人才有權
處分（民法第七六
五條），任何人就
他人所有不動產為
買賣行為，在法律
上均不生效力（民法第一一八條第
一項）。

因此，某甲不但可以不給印鑑
證明，如果願意，尚可提起民事訴
訟，訴請法院判令某乙與某丙遷讓
交還房屋。其中某乙部分，因某甲
未收租金，無條件借給使用，法律
上叫做「使用借貸」。借貸未定期
限者，貸與人可隨時請求返還借用
物（民法第四七〇條第二項）。

某丙部分，因某丙對於某甲而
言，並無任何正當權源，占用該房
屋。換句話說，某丙無權占有某甲

房屋，某甲本諸所有權作用，得請
求返還（同法第七六七條）。

某乙將某甲的房屋，冒稱自己
所有，出售給某丙，詐得錢財，已
觸犯詐欺罪（刑法第三三九條第一
項）。

詐欺罪追訴權時效，自犯罪成
立之日起算，長達十年（同法第八
〇條第一項第二款、第二項），如
只經過一年多，追訴權時效仍未消
滅。

屏東縣萬丹鄉社皮村五十三之
五號林岳先生問：



法律問題解答

有甲、乙、丙
三人。甲地在西，
乙地在東，丙地在
南。甲乙之間有四
公尺寬水利地，現
有一水溝。
最近丙向水利
會申請將原水溝鋪
水泥，水利單位答
應要做，但因乙出面阻止，至今未
動工。乙的意思是移向甲所有土
地重做水道，甲不答應。請就法律
觀點表示意見。

本社轉請高瑞錚律
師答覆：
就水利地原有水溝
施工，在法律上不發生
問題。否則，如欲改變
位置，使用私有地建築
水溝還須徵得該私有地
所有人的同意，才能進
行。

溝水開地
須所有人同意

經數天後，用其處理毒片部可提高着
莖率（一般成功率僅一五%左右）。

（可請種苗商向日本訂購大陽
黃皮）或黃冠（黃皮）種子，自行分
離。

（秋水仙素及秋水仙精是同一藥
劑，作為誘發染色體的增加，即將二
倍體植物變成四倍體。（王進生）

禽畜舍消毒

粉「Povidone-Iodine Powder」碘
復合物，可配成水溶液，作雞場、畜
牧場的消毒殺菌，預防各種傳染疾病
，如新城病、流行性震顫、傳染性支
氣管炎等。請問使用的濃度若干？是
否經濟合算？（桃園縣平鎮鄉復旦村
合作街九〇巷二號張耀人）

【答】：碘製劑是一種非常有效
的皮膚消毒劑，碘片是一種很好的飲
水消毒劑，過去獸醫常用碘仿（Iod-
oform）散於動物傷口，以消毒殺菌
，但因價格較貴，且有臭味，所以現
已不常用。

「Povidone-Iodine Powder」
PVP 碘復合物與動物傷口接觸後，
慢慢放出碘來，一%、一·五%濃度
可用於局部的消毒。

理想的消毒藥，價格應便宜，且
無刺激性。一般畜舍、運動場等消毒
，均用「煤溜油醇」，以溫水配成二
%溶液。同時應保持飼養場地的通風
、乾燥、清潔衛生，平時注意疾病的
預防，必可減低飼養成本。

目前兩性界面活性消毒液普遍用
於禽畜的消毒，不妨試用看。（唐清
芬）

皇帝豆毒素病

【問】：（我所種的皇帝豆植株
衰弱，最初葉邊乾枯，開花就落，漸
漸全株變黃落葉。這是什麼原因？又
生出的豆莢都是歪的，而且稔實率很
低，這又是什麼原因呢？

（蔬菜紅蚜虫應如何防治？）（台
南佳里鎮安西里二六一號黃碧龍）

【答】：（一）可能是由毒素病及銹
病所引起的。兩者都會導致植株衰弱
，生殖機能差而發生稔實率遞減。又
皇帝豆的授精需適宜的空中濕度，如
空中相對濕度低於七五%，稔實情形
差，最近半個月氣候異常，晝間氣溫
達攝氏三十一度左右，也是使稔實差
的原因之一。

為使皇帝豆植株生育健壯須：

1 選排水良好的壤土或砂質壤土
酸度為 pH 六·二~六·三的微酸性
土壤栽培。

2 多施腐熟堆肥或厩肥，並施用
過磷酸鈣作為基肥，使根部發育良好
，根腐菌的形成順利。

3 乾旱季應作適宜灌水，保持土
壤適濕。噴射「倍新裕」乳劑五〇〇
~六〇〇倍液防治紅蜘蛛及蚜虫，以
減少毒藥病的發生。

4 在未發病前噴射「大生四十五
」可濕性粉劑五〇〇倍液，每隔七
~十天一次，繼續三~四次。

（紅蚜虫宜噴射「益加津」乳劑
一、〇〇〇倍液，每隔三~五天噴射
一次。蚜虫是單性生殖，繁殖率快，
所以須繼續噴藥，才能有效防治。經
過二~三次後，宜改用五八%「乃力
松」乳劑一、〇〇〇倍液，以免蚜虫
發生拮抗現象，使藥效差。（王進生）