

養豬村如何經營與管理？

自己養母猪

在美國的大農制度下，養豬事業的經營方式，大約可分為下列三種：

第一種：種豬場，專門繁殖仔豬，出售給其他豬場，供為繁殖或養為肉豬之用。

第二種：專門養肉豬。

第三種：養母猪，也養肉豬，亦即飼養自己所需要的肉豬。

二十幾年前，養豬業者都喜歡將母猪與肉豬分開經營，因為管理上比較方便。但是近十年來，養豬業者為了要更有把握地獲得優良豬種，特別是精肉生產率高的肉豬，同時還為了降低養豬成本，於是多採取第三種方式。

本省也是一樣，十五年前仔豬多由「猪母庄」所供應，但從綜合性養豬計畫在屏東縣開始，而指導農民自己飼養母猪技術之後，農民們——尤其是專業區內——已普遍飼養母猪，自己供應仔肉豬。

一年一百頭肥豬

養豬規模的大小，不必太受土地面積所限制。然而，一個最合乎經濟的養豬經營規模，原則上却要看你有多少土地，能利用多少糞肥，然後才作決定。

因為本省農家所有土地平均只有一甲地，因此經常維持五、六十頭豬，使一年生產一百頭肥豬，是最理想的規模。

以過去所介紹的「輪複式養豬」方式，一個有一甲地的養豬農家，應該安排的事情如下：

(一) 要一年生產一百頭肉豬，必須飼養六、八頭母猪。

飼養十頭更好，一則可以保证仔豬供應無缺，多了還可以出售，增加養豬的利益。

(二) 這十頭母猪的大小要不同，以便於不同時間配種，不同時間生產。

(三) 十頭母猪一年可望生產十八胎仔豬，將一年分為六期，每期應該有三胎仔豬產出。

(四) 為管理方便，除規定每期配種母猪頭數外，還要將每一批母猪的配種期先安排好。

也就是每二個月，規定於第一個月的上半個月或十天內同時配種，這樣以後仔豬可同時產出，同時飼養，而且同時離乳。產仔數多和少的，又可以互相調節飼養。

這種安排方法，在第一次配種也許比較困難，除非用藥品刺激母猪發情，但仍可讓早發情的母猪延遲一個周期配種。

第二次配種就可利用仔豬離乳的時間來調節母猪的發情時間，也就是有的仔豬可在二十八日離乳，有的可以到五十六日離乳。因為一般母猪都在離乳後七、八日就發情，調節離乳時間自可使母猪在同一時期內配種。

(五) 未生產的母猪可混養於一般母猪舍，能混養於小放牧場更好。至生產前一周，才趕入生產厩。

(六) 每批哺乳仔豬必須同時離乳，離乳後先消毒猪舍，然後讓猪舍有二個星期的空閒期，這樣至少對於有「仔豬尅星」之稱的白痢或黃痢，可減少得多。

(七) 離乳後，母猪移入一般母猪舍或放牧場，等待再配種。



種公猪採精

仔豬放入仔豬育成舍，在二十公斤體重後依大小分開放入肥豬舍，四個月後就可以出售了。

這樣輪而復始，每二個月都會有二、三十頭肥豬出售。

(八) 每頭母猪都必須有記錄，例如什麼時候配種，什麼時候離乳，都應該紀錄下來。然後把猪場經營的日程表安排好，就可以告訴農會的運銷人員你在什麼時候可以供應多少豬了。

中規模經營

輪複式養豬可以小規模，也可以中規模或大規模經營。

假如農家有足夠的土地——五、六公頃，可以從事中規模的經營。就是一頭公猪配三十六頭母猪，一年可有六百頭肥豬出售。

這除了上面所說的各項，還要安排：

(一) 把每十二頭母猪編成一組，讓它們在相近的配種期間和公猪在一起——最好是在放牧場——讓

②爲避免公豬配種過繁，可將哺乳的仔豬於二週內陸續放回放牧場，和公豬在一起。這樣分吮全占用時間也許比較久，但由於配種不必太花時間，而且配種率和產仔率會高些，所以還是很值得的。

公豬可在二週內配種十二頭母豬，而且可能都是兩次配種，但不可連續下去，否則配種效率會受影響。因此，將每二個月只准一批母豬配種的原則生安排好。

猪舍建筑原则

在養豬村裡，農家既然需要養母猪，育成仔豬，以及飼養肥豬，就應建築這三種豬舍。

就小規模的輪複式養豬，也就是養豬村的標準規模養豬來說，原則上要有三間分娩舍，二間仔豬育成舍，一間待配與待產的母豬舍，四間可以各容納十頭肥豬的肉豬舍。

該有一間帶有十欄生產豬的豬舍，一座可以放牧十二頭猪的小放牧場和放舍舍，一座有六間仔猪育成欄的豬舍，和一座有十二欄供肥育用的豬舍。

建築豬舍時，有的農友喜歡找個地理先生先看地理，決定方向。爲了新事業的開始討個安心，我並不反對，可是地理先生並不知道豬舍的建築必須配合養豬管理上的方便，以及肥水的利用，而按照他們「左龍右虎」等理論來決定豬舍的地點與方向，這就害了農家了。

在過去四年中所設立的幾十處養豬村中，大部分都能整整齊齊地把豬舍建好，可是少部分養豬村的農家却相信地理先生的話，把豬舍建的歪來歪去，對於土地利用的影響太大了。

建築豬舍主要的原則是：

(一)通風好，排水好，容易保持乾燥。

(二)配合經營規模，使每間豬舍都能很經濟的利

用。

(三)將肥水儲存，使它不會成爲蚊蟲蒼蠅繁殖



優良種公猪

殖的地方，且能方便地施用肥水於農田。一間好豬舍，應該看不到糞坑，聞不到豬糞的臭味，同時，還要有肥水施灌系統及堆肥舍。

(四)猪舍內外的每一種設施，都要考慮使用上的方便，與讓豬住的舒適，同時還要方便消毒與預防鼠害。

(五)要合乎經

濟原則。過去在養豬村內，尤其是坡地的養豬村，不少農家用山上的菅草蓋屋頂，用山上的木材建屋架，用刺竹破開後打成豬舍的圍欄，所需木材的只有地上的水泥與磚頭，豬舍不但可以「冬暖夏涼」，而且省下了許許多多不必要的投資。

但也有不少農家，因為好勝心強，講求豬舍「好看」，那就大錯了。

平地的不少養豬村，是事先經過土地重劃的，在這些地區，為避免破壞農地完整，以致影響耕作上的方便，豬舍應蓋在田的一端，不過還得離開主要道路十幾公尺。假如有的田畝高，有的田畝低，那就該盡量把豬舍蓋於高田畝內。

坡地上的豬舍，則必須蓋於高處。這樣肥水可以自然流到農田，節省電費，而且保持豬舍乾燥。坡地最頂端下約十餘公尺處，是蓋豬舍的好地方。蓋在山頂上雖然通風好，但是冬天風太大了，仔豬保溫不易，而且夏季容易遭受颱風之害。

豬舍和人的住家一樣，也以向南或東南爲宜。在坡地上，冬季可以避免北風的吹襲。平地上雙邊的豬舍，就不必考慮方向，但仍應於向北的一邊多種些樹木，或準備遮板作爲冬季防風之用。

猪精液供應站

有一件事我要附帶在這裡告訴各位：在台灣區雜糧基金會的協助下，農林廳畜產試驗所已經在苗栗、彰化、台南和鳳山建立了四處豬隻精液供應站，所養的公豬是買自公豬檢定站，或經畜產試驗所檢定精選過的，平均飼料效率都在二·五左右（餵二公斤半飼料生長一公斤），背脂厚度只有二·五公分左右，每日增重〇·八公斤以上，生下到達九·十公斤所需的日齡在一六〇天左右，是非常優良的豬種。

這四個供應站，每天把公豬精液送到各鄉鎮農會，農林廳還準備訓練農民人工授精的技術，使必要時可自行人工授精。各位如需上述公豬精液，可向鄉鎮農會要求供應。有的農會（如台南縣學甲鎮農會）還備有採精公豬的彩色照片，各位更可指定所喜歡的公豬。希望大家多多利用，改良豬種。



一種豬性能檢定合格證明書