



香菇採收期

〔問〕：看過「食用菇栽培技術」一書中香菇栽培後，有下列數點不明之處。

(一)一般而言香菇自接種到長菇，須時若干？採收期有多長？

(二)如原木有一萬斤，菌種需多少瓶？產量若干？

(三)埔里地區接種時期，以何時為宜？

(四)鑽孔器何處有售？(北市三民路三巷十八)三號施芳銘)

〔答〕：(一)接種到初期長菇約八個月，採菇時間約四個月。可連續採收三、五年，但須注意夏天不可超過三十度。

(二)一萬斤木材，約需五十瓶菌種，鮮菇產量約為木材重量的一·五成，即一千五百斤。香菇乾重量約為鮮菇的七分之一，即兩百多斤。

(三)埔里地區於秋末或初冬接種，到翌年秋天採收。

(四)鑽孔器，一般以電鑽為主，五金工具店均有出售。(杜自疆)

楊桃象皮病

〔問〕：我種植的七年生一林種軟枝楊桃，最近兩年來，發覺部分果實表皮有花斑現象。請問：

(一)這是何病？應如何防治？

(二)所發花芽大部分為雌性花蕊，不結果，是何原因？(彰化縣二水鄉光化村員集路187~9號鄭本智)

〔答〕：(一)這是銹啤所引起

的，有人稱為「象皮病」。發生初期，尤其在四、十月高溫乾旱期間，每兩星期噴布一次下列任一種藥劑，至銹啤全部滅除為止：(1)二·五%「克氣末」乳劑一、〇〇〇倍稀釋液。

(2)「錳乃浦」可濕性粉劑一、〇〇〇倍。

(3)「波美二八度石灰硫磺」合劑一〇〇倍(高溫季節少用)。在果實發育後半期行套袋，可減少病蟲害。

(二)楊桃一般為兩性花，有五枚顯著雌蕊着生在雌蕊周圍，雌蕊一枚，本淡黃色，柱頭四、五裂似雄蕊，須仔細辨認。花柱短縮，子房肥大，上位五室。信中所稱不結果，可能由於開花幼果期土壤過於乾旱，陰雨日照少或樹體營養失調所造成。(范念慈)

瓜蔓根頭潰爛

〔問〕：瓜蔓在開花結果期，離地二、五公分處，先呈濕潤狀，然後變軟、腫大、潰爛、枯死，這是什麼原因？如何防治？(竹東鎮東寧路六三號溫兆強)

〔答〕：如莖內沒有瓜蠅幼虫，可能是蔓枯病引起的。防治方法為：

(1)根頭塗擦「錳乃浦」加水一〇〇倍藥液，或用「多保淨」加水一〇〇〇倍液，或以二種藥劑混合塗擦，每星期二、三次。(2)用「錳乃浦」四〇〇〇倍或「免賴得」二、〇〇〇倍注意根頭部噴藥，每五、七天一次，雨後再噴。(郁宗雄)

豬子宮內膜炎

〔問〕：(一)母豬分娩後，如感染子宮炎等病症，陰部有白色石灰質液流出。應以何種藥物洗滌治療較佳？

(二)生產不良的母豬如欲淘汰，在肥育期間應如何防止牠發情？

(三)母豬交配後是否受孕，在前期不易看出，到後期有時尚在懷疑階段。如果到生產日發現空胎，飼料損失太大。是否有早期鑑定受胎的方法？

(四)母豬缺乳是否與給飼量有關？懷孕前期、後期及生產後的正確給飼量各為若干？

(五)仔豬鐵劑注射二次是否會較佳？約各在何時注射較妥？

(六)仔豬出生後，全羣後肢不能站立，一星期內全部死亡，是否因母豬飼料中缺鈣質，又應如何減少仔豬下痢？(台南縣歸仁鄉石厝村一〇六)五號蔡石城)

〔答〕：(一)分娩後一、三日由外陰部流出淡白色量不多的惡露多為陰道炎。如果是子宮內膜炎，發生時期較遲，流出的惡露顏色較濃，呈黃白色且有粘液性，或轉為膿樣有惡臭。子宮內膜炎的治療較困難，須注射抗生素，或併用磺胺劑施行子宮洗滌。先以滅菌生理鹽水，或陽性肥皂(兩性亦可)消毒水，或高錳酸鉀或硼酸水等等洗滌(每次反覆注入二、三次)

(二)母豬至今尚無簡單而早期的妊娠鑑定方法。一般採用下列方法：(1)檢查膀胱膜上皮細胞的變化，妊娠二〇天就可鑑定，但本法必須採陰道粘膜活體組織，須有病理檢查設備才能鑑定。(2)利用超音波探測。(3)用手由肛門探察子宮動脈是否已增大，但必須到妊娠四〇、五〇天或技術熟練才能可靠鑑定出。(4)利用「伊絲達蒙」於妊娠十七日時測驗，是現在唯一簡單的鑑定方法，但不十分可靠。

(三)母豬缺乳與飼料量無很大關係。缺乳或泌乳量不足的原因可能是由產熱、子宮內膜炎或其他疾病所引起，與遺傳也有關。母豬肥胖乳腺發育不良，賀爾蒙(垂體後葉)分泌不足也是重要因素。


母豬的飼料量妊娠前期二、〇公斤，蛋白質占一四%，妊娠後期二、五公斤，蛋白質占一六%，哺乳期(一、三週內)必須增加至四、〇公斤，蛋白質占一六%，哺乳三週以後飼料量減少。如果仔豬頭數超過八、九頭，每增加一頭，需增加〇、四、〇、五公斤的飼料。

(四)鐵劑的用法普通在出生後

等藥液流出後，再注入抗生素(配微素、四環素等等)或併用磺胺劑。一、三、五次可望痊癒。

(五)生產性能不良的母豬應即淘汰。除非太瘦以外，似無肥育的必要，否則飼料換肉率極不良，只是增加脂肪不合算。

(六)仔豬出生後，全羣後肢不能站立，一星期內全部死亡，是否因母豬飼料中缺鈣質，又應如何減少仔豬下痢？(台南縣歸仁鄉石厝村一〇六)五號蔡石城)



購買不動產之前 應先查明有無抵押

彰化縣溪湖鎮清底里五十八號陳樹根先生問：
依照最高法院判例，丈夫以太太的名義購置不動產，夫之債權人仍得請求查封拍賣。請問：
如夫之債務發生在先，其後夫妻至法院辦理「夫妻分別財產登記」，能不能免受查封拍賣？

登記前，夫或妻所負債務的債權人，不生效力，因此，來函所述，夫負債在先，然後再向法院辦理夫妻分別財產制登記手續，不能免於被查封拍賣。
夫妻財產制契約的登記，應附具夫妻財產契約書，由雙方共同聲請。但契約如事先經公証處公証，得由一方聲請。手續並不麻煩。
任何人得向法院非訟事件登記處聲明利害關係，請求閱覽夫妻財產制契約登記簿。

抵押權是一種「物的擔保」，對物不對人，不因抵押物所有權移轉而受影響。銀行就與某甲所約定一百萬元的範圍內借款與某甲，如屆期某甲不還，銀行自得聲請法院裁定拍賣抵押物，就賣得價金優先受償（超額部分只能列為普通債權），某乙的主張無理。所以，購買不動產時，應先查明有無設定抵押權或其他物權，以免遭受損失。

夫妻分別財產登記手續是不是很麻煩？

任何人都可查看什麼人辦過此項登記嗎？

又，某甲提供自己的不動產，向銀行設定最高限額新台幣一百萬元的抵押權，先借得六十萬元。

嗣後某甲將不動產移轉給某乙，又向銀行借得第二筆錢五十萬元，合計一百十萬元，比設定額多十萬元。後來某甲倒閉，銀行聲請法院裁定查封拍賣已屬某乙名義的抵押物，某乙主張某甲後借的五十萬元不得從拍賣所得價金中取償，是否合理？

如借款本金等於設定額時，滯欠的利息有無優先受償之權？

本社轉請高瑞鐸律師答覆：
夫妻財產制契約的登記，對於



法律問題解答

如果事先約定利息也在擔保之列，即得優先取償。此與借款本金多寡，及是否多於或少於設定額無關。


二、四日時，注射一次二〇〇毫克就可達到目的。如果要注射二次，那麼第一次注射一〇〇毫克（二、四日時）再過一、二周時再注射一次，或對下痢嚴重的豬隻也可補打一次二〇〇毫克。
（六）所生仔豬全部後肢不能站立，一周內死亡，與缺鐵似無關係，可能是由臍帶感染細菌所引起的關節炎或敗血症。
在母猪飼料中添加磺胺劑或注射磺胺劑，可以減少仔豬下痢。（張聯欣）

西瓜毒素病

〔問〕：我所種的西瓜，植株生長衰弱，新梢節間短縮，葉片變小且呈畸形，葉面起凹凸。將葉片摘下來，對着陽光或燈光，可以看到綠色、黃色錯綜交雜。請問這是何病？應如何防治？（花蓮縣玉里鎮東豐里林芬六九號黃富春）

〔答〕：這是嵌紋型毒素病，通常在高溫、多濕，或軟弱徒長株，或由病株採種，或連作等情況下容易發生。

防治法為①由健康植株採種，或由無病區買種子。②避免連作。③苗床、瓜床土壤用「溴化甲烷」燻蒸，每平方米公尺使用四〇公克。溫度稍低時，用量稍作增加。④西瓜種子播種前用「烏斯普龍」八〇〇倍液浸漬三〇分鐘。（邱坤元）



青黴菌污染菌種

〔問〕：我依照貴社出版的「食用菌栽培技術」上的方法培養菌種，但發現受到青黴菌污染，請問應如何防止青黴菌的污染？（彰化二水鄉惠民村九九號陳正男）

〔答〕：青黴菌是空氣傳染菌，所以操作技術不熟練或在空中曝露時間太久，會受到青黴菌的污染。培養基的營養與酸鹼度不符合培養目的菌類，而反而符合青黴菌時，更容易被污染。

所以應注意接種室的消毒、接種箱的消毒、酒精燈火的使用法、移植針的消毒等，就很容易成功。尤其是冬季最容易作好菌種培養的工作。（杜自強）

豬瘟疫苗

〔問〕：（一）豬何時打豬瘟疫苗（剪耳梁）最適宜？

（二）留種母豬以何種為優？（南縣安定鄉中沙村二九、二號石東明）

〔答〕：（一）注射豬瘟疫苗的正確時期，是小豬出生後六周（四、五天）左右，再過一個月左右打一次，就可完全預防豬瘟。如果是留種母豬，配種前再打一次，以後每年打一次，就很安全。

（二）生產肥豬用的母豬，最好是以「藍瑞斯」（L）母豬配「大白豬」（W）（大型約克夏）公豬，將生下的一代雜種留種。
以此與「杜洛克」公豬交配所生產的肥豬用，生長及飼料利用率均佳。（張聯欣）