

小巧的松葉牡丹

舒麗菊

松葉牡丹學名為 *Portulaca grandiflora*，是馬齒莧科 (Portulacaceae) 之植物，原產於巴西。植株低矮，具有半匍伏性，莖呈紅色，葉片窄狹，其橫切面為圓柱狀，呈綠色，莖葉均為多汁性。

每年到了六月至九月，會開出很多美麗的小花。花徑約一英寸左右，中心有多數明亮的黃色雄蕊及一個柱頭五裂呈星狀的雌蕊，浮凸於碟形的花瓣上。

松葉牡丹花形似牡丹，而葉形似松葉，所以名為松葉牡丹。因花朵多半在白有陽光時開放，至傍晚日落以後即閉合、凋謝，所以英名稱爲 Sun plant。

變種有重瓣混合及單瓣混合，每一種都有很多顏色等級不同的花，包

括黃、白、粉紅、橘、玫瑰紅、血紅、深紅、紫色……等。

重瓣種的花形似薔薇，但通常一包重瓣種的種子發芽後，往往會發現其中含有少數的單瓣花。

此種植物以播種法繁殖，可以在三月播種於木箱或繁殖皿中，置於溫度攝氏約一八度的溫室中，待幼苗長至五、六公分時移種於盆內，或移種於室外花壇中。

但須在五月移出前，先放置於冷床上，以免受到凍害。

或者在四月或五月氣候較溫暖時，直接將其種子撒播於花壇內，或是庭園中也可以。

播完種子後須微覆土，以免被風或大雨沖移，並澆水，供給種子發芽所須之濕潤環境。俟幼苗長出後，按一定距離行疏苗，以免植株過於擁擠，致發育不全，或徒長而死。


看到幼苗倒伏於土面上時，須將腐爛植株丟棄



松葉牡丹

並將尚存的健康植株移到不同位置的土壤中，以防止細菌感染傳布。

如果有蚜虫吸食植物汁液時，會阻礙植株生長，使植物變的黏黏的，而導致煤烟病——植株變黑，似有煤烟附於植株面上，可以用馬拉松液噴洒防治。



由上而下：玫瑰（阿那）、金魚草（錦聰賢）、菊花