

(一)在猪舍附近約一公尺處噴殺草劑。是否藥毒影响母猪？

(二)在猪舍附近約一公尺處耕地，母猪是否因振動而發生流产？(高雄甲仙關山村中和巷八十九號徐尚龍)

[答]：母猪同時流产原因複雜，可以想到的原因有傳染病及飼料或藥物中毒等。對你所懷疑的三個原因檢討，第三項不成立。第二項除非你所用藥液泡法不對，泡得太濃或噴霧時風向吹入猪舍內，關係不大。那麼最可能是出在第一項。

樹薯含有很毒的氰酸，氰酸含量多少，依品種加工處理法(日乾、烘乾、煮沸或水洗等)而異。含量多，有時會發生急性中毒甚至死亡。以樹薯餵猪，乾者不要超過一〇%，生樹薯不得超過總量二〇%，不然會出問題。你每天餵一斤生樹薯已超過了二

〇%。

樹薯中毒，照吃量而不同。吃得太多引起急性中毒，嘔吐、必伴亢進發汗、呼吸困難、窒息而死。中等量時，粘膜潮紅，強直痙攣，癱瘓樣發作，體溫下降。少量時，興奮流涎、下痢、輕度痙攣等。(張聯欣)

猪舍·雞舍

[問]：(一)在同一場地養猪與雞，猪舍與雞舍距離五公尺是否太長？(二)每坪地可養肉雞若干？

[答]：(一)可在南北長約四〇公尺的一分地，北邊養猪，南邊養雞？在此建築猪舍與雞舍，應注意那些事項？(高雄縣橋頭鄉西林村文明巷三三號陸吉副)

[答]：(二)便於管理五公尺並不會太長。



讀者來信

國時報 一月會
刊登一
則消息
，稱本
鎮有一
位孫賜
寶農友栽培洋菇，濫用農藥，引起
嚴重藥害，損失重大。這消息刊出
後，農林廳、台灣省農會皆曾來電
話查詢。

貴刊第二十七卷第四期第七頁
又將此消息轉刊，使關心本會人士
紛紛指責頗受困擾。

事實上，本鎮並無菇農孫賜寶
其人，更無濫用農藥之事。而本鎮
洋菇栽培一向採用政府所指定的農

藥，由本會直接供給菇農並切實指
導使用。特此說明，以正視聽。

彰化縣北斗鎮農會總幹事賴銘揚

我是個農家子弟，從小學畢業
就開始訂閱貴刊，直到現在仍保持
著訂閱兩份的習慣，一份是做資料
用，另一份是攜帶身邊隨時閱讀吸
收新知。「豐年」在我身邊已十五
年了，它不時在指導著我。

除了栽培技術之外，從「農村
家庭」中，我也慢慢地懂得家庭計
畫之道。

因此我認為「豐年」是充實我
們生活最好的一本農業雜誌，無論
是您自己看或是訂閱給子女們閱讀
，都將受益無窮。

竹南鎮公所建設課蔡有仁

(一)每坪地可養肉雞三〇隻。

(二)可以。猪舍、雞舍均應朝南建
造，注意排水通風，南部氣候炎熱，
以採用開放式，冬暖夏涼為佳。(唐
清岑)

百香果汁

[問]：我自製百香果濃縮汁，
酸度過高，影响品質。請問應使用何
種方法或添加物，能降低酸度？

(一)上述果汁，會呈沉澱狀態，原
因為何？應如何減少沉澱？(花蓮水
璉一一八號陳毅儒)

[答]：(一)百香果汁因富有天然
色澤及優良風味外，尚有極高酸度
黃色種百香果汁酸度二·一七%，紫
色種百香果汁一·二八%，才被採
用為製果汁的良好材料。如把酸度減
少，即失去天然酸味，難製成良好果
汁。

一般市面所售濃縮百香果汁，是
用百香果原汁加砂糖配成糖度六五度
Brix的果汁，用冷水五倍沖淡飲用
。酸甜度均宜口。因此濃縮百香果汁
不必減少酸度。

(二)百香果單獨製成果汁時很容易
沉澱，如能加入砂糖配成糖度六〇
七〇度 Brix左右，再用均質機打成
均質狀態，或加入少許CMC(抗沉
澱劑)，就能減少沉澱。(黃木田)

蛋黃果

[問]：(一)蛋黃果(仙桃)在本
省何處適宜栽培？

(二)蛋黃果幾年後可以結果？產量
如何？

(三)蛋黃果在本省產地在何處？經

濟價值如何？(台中縣東勢鎮茂興里
東南街二一四號邱清祿)

[答]：(一)蛋黃果在台灣中南部
可以栽培。

(二)嫁接苗種植後三、五年開始結
果。初期產量不多，成齡後產量頗高
。種苗請向彰化縣永靖鄉一帶苗圃洽
購。

(三)蛋黃果非重要經濟果樹，在嘉
義一帶栽培較多，因生產甚少，果實
售價頗高。(張振甫)

正番鴨園飼

[問]：正番鴨一般放飼在屋外
，接受陽光照射。如養在通風良好，
而無陽光直接照射的室內，有何不良
影响？園飼應注意那些事項？(台北
一六一八五信箱鄭錦聲)

[答]：正番鴨屬肉用種鴨，每
天須能照射陽光三小時以上，加礦物
質維他命補助飼料，水浴，才可保健
康。母番鴨富賴抱性，有陽光照射較
易恢復產蛋，否則產蛋量少。所以陽
光可促進抵抗力使鴨羣健康。

如限於設備，園飼時，應注意1.
保持室內排水良好，清潔衛生。2.勿
過度密飼。3.防止鼠、貓、狗自由進
入。4.驅除蒼蠅，5.供給平衡飼料。
否則易成
細菌病毒
繁殖的溫
床，鴨抗
病力弱，
易於軟脚
、啄毛、繁
殖力低。

(唐清岑)

