


洲綿羊試養成功



蔡界旺



無角道色特綿羊

續均不佳，經改善之後已漸趨正常。

現將兩種比較可以適應本省氣候的綿羊：無角道色特與紹絲當的特性及飼養方法介紹如下以供有意養殖者參考：

無角道色特 (Poll Dorset)

1 用途：肉毛兼用。

2 成熟時體重：公羊一〇〇

一五〇磅，母羊九〇一三五

磅。

3 原產地：英格蘭南部

Dorset 那

4 特徵：臉耳四肢為白色且無羊毛，鼻孔唇及皮膚為淡紅色，體型中型，為優美中型羊最佳代表。

紹絲當

1 用途：肉用

2 成熟時體重：公羊為九〇

一三〇磅，母羊為九〇一二

五磅。

3 原產地：英格蘭東南端郡

等地。

4 特徵：軀體緊湊、寬而深，四肢豐滿、短，身體對稱，屠體品質佳，毛尾短。

採用圈飼

台糖嘉義海埔墾殖處由於受濱海環境的影響，採取圈飼方式，每日飼餵青草兩次，精料一次。

農友們若當副業經營飼養時，可採取下列方式：

1 放牧與圈飼並行：下雨時採取圈飼，沒下雨時，可以把羊趕到有草的空曠地等去吃草，傍晚時再趕回羊舍，並飼餵少量的精料。

2 圈飼：每日餵草二三次，並很少量精料，如有充足的牧草可讓它任食，可減少飼餵精料量，降低飼養成本。

一般綿羊利用牧草的能力極強，因此如能有適口性良好、蛋白質含量高的牧草，則精料的給飼就只限於肥育仔羊及用於種畜。

通常成羊每日的飼料量，草料四六公斤，草的種類如田埂草、花生藤、巴拉草……等皆為良好的羊草；精料〇・二〇三公斤（精料配方附表）

表 一	含量%
黃玉米粉	50
脫脂黃豆粉	20
甘薯簽	18
脫水青飼料	10
去氫磷酸鈣	1
食 塩	1

3 給水：羊舍內以容器盛清潔水給羊喝。

4 修蹄：蹄長時用剪刀修剪，以免蹄裂引起爛蹄病，通常四個月修蹄一次。

5 剪毛：每年一次，剪毛在三四月間，台糖墾殖處的綿羊頭數多，都以電剪，一般農友可用剪刀剪毛即可。因個體品種不同，羊毛的年產量在三六公斤左右。

種羊飼養

綿羊的發情有季節性，台糖墾殖處試養觀察結果，發情在六月十二月之間，配種採自然



澳

交配。懷孕期胎兒生長快速及哺乳期盡量供給乳汁，母羊需要較多營養，因此須充分供給草料及多加一些精料（每日〇・五公斤）。

分娩前二周，乳房有明顯的垂乳現象，為分娩前的徵兆，注意防止妊娠後期碰撞而造成流產損失。分娩後如有胎衣滯留時，應請獸醫治療。綿羊妊娠期一般約一五〇天左右。



—羊舍中的羊羣—

仔羊飼養

生下來的仔羊，若口腔，鼻孔內有粘液時，應即時用手指把它清除，以防窒息死亡，臍帶以碘酒消毒，身上的粘液讓母羊將其舐乾，以增加母羊的愛子心，並要注意觀察仔羊有無吸吮母乳，以防止仔羊餓死。

少數不會吸乳的仔羊，只須教牠三、四次即會，不留作種公羊的仔羊，於生後第二周請獸醫去勢。

出生滿四個月，體重在二十公斤以上時，即行斷乳。

斷尾：仔羊出生後一、二周應即行斷尾，在第二至三尾椎處用燒熱鐵剪剪斷，以促進羊隻快速生長。

肉羊飼養

去尾的仔羊於斷乳後，即盡量供應牧草讓其任食，精料依體重一%飼餵，以促進其生長，經過一年後體重約在四十公斤即可出售。

疾病防治

綿羊的疾病很少，常見的有消化不良，呼吸系疾病等，可請獸醫診治。

肉毛兼用

本省羊肉的供應，一部分來自本省山羊，一部分靠外國進口。

肉毛兼用種的綿羊，經台糖畜殖處試驗後，証明可以適應本省的氣候，而且其性情馴和，飼養容易，生長快速，一年可生長到四十公斤。經試驗結果，綿羊屠宰率在五%，淨肉率三四%左右，皆高出本省山羊，且肉質鮮美。

此外每頭每年有三、六公斤的綿羊毛



綿羊捨食料

收成，農友們數量少，可自行脫脂漂白作成綿羊毛被，或賣給毛紡廠加工。

綿羊皮可加工製成皮革。

瓜子瓜

西瓜（包括小型西瓜）和瓜子瓜彼此間容易發生雜交，但是不會發生不稔現象而增加白色秕，而且無顯著的花粉直感現象，即瓜子瓜內的種子不會因受西瓜的花粉而變小，也不會增加白色不稔秕。但是這種瓜子已難交，只適食用，不適再留種栽植；反之普通西瓜受到瓜子瓜的花粉，西瓜內的種子也不會顯著變大而影響品質。（郁宗雄）