

紋天竺葵色彩鮮明

林雄

紋天竺葵一般僅稱為天竺葵，南非原產，屬牻牛兒科的亞熱帶性宿根植物。老株莖基部木質化，高約一公尺。四季有花，色彩鮮明。

通常以五號盆種植一株，摘心一二次，促生側枝數目，以提高觀賞價值。長枝帶花供切，乃高級插花材料。

葉圓形乃至橢圓形，柄長，緣具鋸齒狀，葉面有馬蹄形紫斑。紋天竺葵以外種類，並無顯明的斑紋。花單瓣或重瓣，有白、桃、紅、斑紋等各種色彩。

紋天竺葵的葉色具有黃、白、紅銅等斑紋或鑲邊，無花時葉尚具充分的觀賞價值。花期除紋天竺葵為四季開外，其他品種大部分在春夏之間開花。因其花葉並美，鮮艷而富變化，最宜盆栽供作室內裝飾。

種類

紋天竺葵 (Geranium zonale

L.)：又名四季紋天竺葵。為普通常見的青葉不具斑紋者，繁殖簡單旺盛，栽培容易。本省到處都有栽培。

高級品種的葉均有各種斑紋，曾是歐美各地風行的盆花，所以斑葉園藝品種甚多。栽培上較普通種略為困難。

夏天竺葵 (Pelargonium domesticum Bally)：原產地同是南非，和紋天竺葵不同的是：葉薄無斑紋，莖細長

，高可達二公尺，開花僅春天一次而已，花色如紋天竺葵外尚有紫色，花形大，花期短。五花瓣上一二枚大，下三枚小，並且上下瓣分開着生。



中國蘭 (阿那)

栽培

栽培方法說明，雖然着重紋天竺葵，但其他種類大致相同。

用土和肥料：以四、五號盆種植一株，摘心促生三、五分枝，養成高度三〇公分，觀賞性最高。用土如有養雞場的表土可使用，能獲得優異的成果，不必另行追肥。如單用田土會呈缺肥現象，葉色變淡，下葉黃化，此時必需施肥。下部葉片變黃嚴重是因盆內根塞不能吸收水分，或缺肥，對策是施肥並補充新土或換盆。

繁殖

優良系統品種有採用實生法者，但一般都用插木法。盆栽要求開花整齊，插木宜在四、六月，秋季開花。如要四、六月開花，插木時期改在九、十月施行。

插木成功與否，要看母株的充實



天竺葵 (阿那)

牛蔓天竺葵 (Pelargonium hybridum Hort.)：伸展長莖蔓狀，有橫臥的傾向。盆栽最適懸崖培養，風情別致。葉形勁直，緣呈淺缺刻。花形類似紋天竺葵，但缺少變化。

萬葉天竺葵 (Pelargonium peltatum Ait.)：易和牛蔓天竺葵混合，適宜盆栽懸崖培養，莖長八〇—一〇〇公分，平滑，有自節部彎曲性質。葉如萬葉五角形，淺裂為五片。葉柄基部和節部略形隆起。繖形花序，花數少，色以濃紅、淡紅、赤等為多。

麝香天竺葵 (Pelargonium foliolatum Hoff.)：也是南非原產

，葉小，心臟形，葉緣細鋸齒，色黃綠鮮麗，具芳香。花細小宜小盆培養，僅以手指觸葉，便發出強烈的香味。多供工業用提煉香油栽培，現今非洲和菲律賓栽培最盛。為發展香油事業，值得引進試種。

橡皮樹優良庭園木

●●● 林樹之

台灣栽培的橡皮樹有兩種，印度橡皮樹及黃邊印度橡皮樹。因葉大而厚，既可阻擋強烈陽光，又可觀賞其美麗的大葉，所以城市街道很多選它作行道樹，作為庭園樹也很美觀。

印度橡

皮樹屬桑科

，學名是

Ficus el-

sica Roxb

，常綠大喬

木，葉大橢

圓形，或長

橢圓形，長

可達三十公

分，先端呈

短尾狀很尖，包藏新芽的托葉，大而作披針形，淡紅色，為這類樹木的特色。

黃邊印度橡皮樹，學名是 *F.*

elastica Roxb. variegata Hort.

，亦稱變葉楠榕，常綠小喬木或灌

木，青葉邊緣有乳白色或黃色的花

紋，很是美麗，包藏新芽的托葉亦

大，呈美麗玫瑰紅色，斑斑點點呈

黃、綠、白的大葉，可與斑葉榕、

斑葉九重葛和福祿桐等觀賞植物媲美。栽作庭園樹，綠中點綴着黃白

另有一番滋味。

繁殖及栽培管理：這類樹木通

常用高壓及扦插法繁殖，扦插法成

活率低，而高壓法成活率較高，所

以應該用高壓法最好。高壓法繁殖

，是選擇二年生健康枝條，環割寬

約一公分許的皮層約至形成層最為

理想。因為形成層是活細胞，易於

生根，要選用銳利的嫁接刀否則成

續不佳。

環割時流出的樹液不必擦去，

高壓的時間以新芽尚未萌出前最好

。環割後立刻把預先準備的飽水粘

土或蘇類包紮，外面包以白色透明

的乾淨塑膠布，兩端捆紮結實即可

。壓枝後避免搖動碰觸，否則就難

成活了。

俟長出大量白根後即可從捆紮

下端，用銳利修剪剪斷栽培。栽

培時先預挖較苗包土處稍深二至三

公分，直

徑較原包

大二至三

公分的植

穴，把塑

膠布解開

，將苗輕

輕納入，

先用沃土

填入周圍

空隙，約

填土一半

時輕輕用

手鎮壓，

再填其餘

一半，然

後澆水。

栽後每日

早晚各澆

水一次。

橡皮



黃邊印度橡皮樹 (鮮聰賢)

樹葉大易招風，所以不能栽在衝風處所，必須選擇避風場地，否則久之便會生長不良或歪向一邊。

黃邊橡皮樹為上選的盆栽植物

，那美麗的斑紋可供欣賞玫瑰色的

托葉，有萬綠叢中一點紅的感覺，

尖尖直直的像一把尖劍，美極了。

橡皮樹高可達十餘公尺，樹冠

較大，因而栽植時要選面積較大的

空曠地方才能讓它發育正常，墾丁

公園的大橡皮樹即其例。黃邊種可

選為盆栽，盆栽苗高約六十公分，

葉十餘枚，與栽培榕樹盆景相仿，

每隔一、二年即需換土一次，供應

養分，增加活力，使生長旺盛。

度。夏天溫高植株較弱，應及早施肥回復勢力，灌水量過多的生長軟弱。採取插芽前十天，就要減少灌水，以利植株生育充實。

插芽宜選取節間短的枝梢。插穗

切成五、六公分，在節下以新刮鬚刀

片，切成水平。頂端留二、三葉，其

餘連托葉一併摘除。插芽附着托葉，

扦插後容易造成腐爛，因此特別注意

托葉的清除。插後約經三、四星期發

根。

插木用土切忌粉質，使用前先用

三、五公厘篩選，粒狀並混三〇%河

砂，以利排水良好。扦插深度以二公

分為標準，過深易腐爛，太淺易倒伏

。所以最好利用盆插，以盆底吸水，

可免因灌水而插芽倒伏。

插芽發根日數依品種而異，通常

約三、四星期，但因季節和營養狀態

而有遲早。插芽灌水勿太濕，保持土

壤不乾燥的程度即可。

插芽後要遮蔭，以避免凋萎，但

不可太過於昏暗。通風良好，光線充

足，才有利發根。

育苗中如見根系伸展於盆邊或盆

底排水孔外，即需換盆。

紋天竺葵花芽分化氣溫為攝氏八

—一〇度。開花期日照強烈需行遮光

。花瓣脫落如久附葉面，易生病害，

要注意清除。

灌水勿濺及葉面，花芽分化前，

減少灌水，土壤略微乾燥為宜。

病虫害少見，偶有葉斑病、斑點

病發生，可使用大生噴布防治。此外

灰銹病施用好速殺或萬力均有特效。