艷陽下的黃胡蝶

黃敏展

夏日烈陽下，特別感到鮮艷的黃胡蝶又名孔雀花、蛺蝶花、金鳳花，爲原產南美洲的灌木。在熱帶及亞熱帶，各地普遍當庭園樹栽培。

黃胡蝶在熱帶地方，常年高溫，四季開花而不落葉。但在亞熱帶像本省，因冬季氣溫常降到一〇度以下，又是乾旱期，所以有部分落葉。有時冬季溫度提早降低，或乾旱過久，嫩梢會枯死，但初夏時仍會重新發芽生長。

黃胡蝶在原產地，可生長高達六～七公尺高的大灌木。花色及葉片都很像鳳凰木，就有「矮鳳凰木」的英名。葉片不大，爲二次羽狀複葉，小葉片呈橢圓形，長僅一・五～二公分。四公分大，黃底朱紅色心的花朶，着生在總狀花序上。紅色的雄蕊花絲突出外面很長，是最大的特色。

可以自行結實，莢果長八～九公分，寬一・五公分。有少數的棘刺，疏生在枝條上，爲其唯一缺點。花色有全黃和全紅的變種，但較少見。

花期很長，從五月可以連續開花到十一月，如天氣暖和，十二月中尚在開花。因花穗是着生在新生長的枝條頂端，所以花穗上的花朶開完之後，需另生長新芽才能開花，因此希望開花多，就要新枝條生長多。當花穗上的花開完之後，常給輕度的修剪，可以促進側枝的生長，也就增加花穗。



黃胡蝶是性質很強健的觀賞花木，只要在陽光充足的環境下，生長快速。能在貧瘠的土壤裡生長，惟在排水良好，肥沃之粘質壤土，生長快。

繁殖使用種子或扦插均可。由於生長快，通常都用種子繁殖，不需任何特別的栽培措施即可。株高有一公尺左右，就開花旺盛。

每年在初春新芽生長前應行強修剪一次，以利枝條茂盛，增多花朶。

很少發現有病虫害發生，適合於成羣栽植在大花壇上，也可以單獨栽植在小庭園。惟需陽光充足之地，不宜種植在大樹下。值得在本省各地推廣栽植的花木。

・左圖及本期封面爲黃胡蝶。本期畫刊介紹夏天的花七種，其中阿勃勒、蒜香藤、雞冠刺桐、紫薇等栽培要點，請參考本社五月一日最新訂正再版的「台灣觀賞植物集」。雞蛋花、百日草及夏堇三種，本刊近期將要介紹。

移植時須注意不要損傷根部，最好能帶土移植。

移植時需挖坑，坑深至少在五十公分左右，底部應填入利於排水的砂石。移植後埋土時，應混合炭粉、砂土及含有肥分的黑土，這樣便能使南天竹的生長良好、開花多、果實大而渾圓。

南天竹是一種觀果植物，冬天部分植物落葉，或者黃不接，而南天竹則有青翠的樹葉，配上一串串鮮紅的果實，令人賞心悅目。

然而南天竹常有開花不結實的情形發生，栽植者最洩氣的莫過於如此。開花不結實的原因，除了前述利用接木繁殖法先天性不能結實外，其他都可針對原因，加以克服。下列幾種方法如能採用，一定能結實良多，堪足觀賞——

(1)改善排水：排水不良爲不結實的主要原因之一。如不結實，首須注意是否爲排水不良。排水不良的消除法，除在根部填塞排水促進的物質外，四周環境的整理尤爲重要。

(2)石灰石肥分的欠缺：如爲此原因，應不時添加石灰石粉。

(3)枯枝、老幹及陡長莖，應不時加以修剪使肥力能集中供應。

(4)三至四年生的植株，應施行斷根，使根部能再生，增加吸收能力。

(5)防止日照不足：在移植時，要注意移植於陽光充足的地方。

(6)新葉長成後，要將老葉部分摘除，以防止耗費過多的養分。

(7)基肥應多施用遲效性的磷酸肥料，使植物體能慢慢地吸收肥分，結實時必能獲得碩大而鮮艷的果實。

(8)不時疏鬆根部的表土，使土壤有良好的通氣及排水，改良土壤的物理性質，自有助於南天竹的生長。

(9)開花時，搖動枝條，促使花粉的活動，使易於到達雌蕊的柱頭而完成授粉作用。但搖動時，不可太用力，以防枝折。

(10)多雨時常妨碍授粉的進行，因此在多雨地區種植南天竹時，尤應注意。