

皋月杜鵑的獨特盆栽

楊紹溥

皋月杜鵑可栽植於庭園，或供盆栽。每年到了五月間，木本花卉開花的不少，而栽植於庭園中或盆栽的皋月杜鵑在此時正好盛開，會把庭園點綴得非常熱鬧，而且美麗。

在建築物的前面，如能種植一叢皋月杜鵑，或者是散植在較大樹木的邊緣，以及石縫間，在日光照耀之下就好像是閃爍的寶石，極為美麗而倍增庭園之美。

如為盆栽，則更能顯出其優美的風姿。台灣栽培的皋月杜鵑，如皋月六號、皋月二四號、皋月四六號、矮生杜鵑、明朝、明朝、新世紀等，都是盆栽的好材料。

因皋月的杜鵑品種，均能具備足夠可以充分發揮盆栽氣質的有風格，所以說它不僅是夏季杜鵑栽培的名貴花種，而且還是盆栽杜鵑的代表種類。

盆栽是由苗床或園圃挖出小苗種植於小盆，促其生出充分的細根，而後順次換植於較大的花盆內，其節間就不會太長。

同時，皋月杜鵑的樹姿花容很優美，所以今日皋月杜鵑用作盆栽，非常流行。

苗木培養：皋月杜鵑苗木的培養，甚為重要，不良苗木或幹枝的排列不良，都不可能使其呈現出良好的生育狀態。

但是怎樣才算是優良的苗木呢？根據筆者對於是類杜鵑的栽培研究，

必需注意以下三點：

①根向四周伸展良好。

②樹幹的基部粗健，且向先端逐漸細小，並有易於彎曲的生育性質。

③枝條排列良好，不密集，並有良好的生長。

具備了以上三點，則皋月杜鵑的苗木必屬優良，作為盆栽一定會有理想的生育。

盆栽用土：盆栽僅能以有限的盆土，供給植物的養分，故其排水保水必需要特別注意。

皋月盆栽，特別要注意盆底用土不滯死水，但也不能過於乾燥而妨礙生育，是以腐植質而輕鬆的砂質壤土最為適宜。盆底先放入瓦片，豆粒狀大小的土裝入盆底，細小的土粒裝入其上。

通常皋月的盆栽用土，較粗糙的與較細末的為好。因為細根性的皋月杜鵑，如果種於較細的土壤時，其毛根會集結於盆面，而影響水的貫通，招致枯死，故較粗糙的土壤對其生育是有利的。

換盆：皋月的盆栽是一年換盆一次，要是叫作換土也很恰當，因為在有限的盆土中，經過一年的生長，土壤中的養分已完全吸收殆盡，初春生

長所需用土必須是新土，故需換盆。

若是隔年換盆，會損傷枝條，故每年換土才是皋月杜鵑盆栽之道。而老樹的換土，必需盡量減少細根的損傷為妥當。


換盆的時間，最好是在春末新芽正要發出時，或是開花後為最適宜。

栽植於地上的要移植於盆內，需要對根施行強剪時，應該是在樹勢生長最為旺盛的花季為最良好。同時在此時期，花蕾、枝梢、葉均需酌予剪除，以防止水分的蒸發。

換盆時，根部的舊土需以竹筷細心弄掉。缺乏活力的舊根（老根），也要加以修剪，促進新根的發生。用濕土栽植時，容易因細土粒深入網狀之根裡，而有受壓緊之害。

因此最好用乾土栽植後，再充分灌水。到了初夏雖不怕陽光照射，但怕熱風吹襲。因此較大植株，換盆後十日內，應將新盆置於半陰半陽無風之處。並經常由樹冠以噴洒方式灌水，而根部不可灌水太多。

灌水：皋月杜鵑的盆栽，灌水應以盆土不乾燥的程度為度。盆土的乾濕，因植株四周狀態而異，如樹齡大小、枝葉疏密、樹與盆之比例、土壤



皋月杜鵑

種類、日照時間、風力強弱、雲霧之有無等原因所影響，因之盆栽灌水，主要的是盆土一乾就要灌水。

皋月盆栽的灌水，要在日照下從樹冠上灌水，這樣會有顯著的效果。不過其他植物的盆栽，在日照時不可以從樹冠上灌水。

在冬季休眠時期，盆土過於乾燥會立即枯死，因而冬季灌水要比夏季更注意。較大植株枝葉的灌水，是上午多灌，傍晚少灌為宜。植物是在夜間伸長，為防止新梢的徒長，當以傍晚少灌為宜，此點在盆栽時需加注意。

羽扇豆婷婷玉立

林雄

羽扇豆和香豌豆在花卉中，是屬於絕無僅有的豆科草本觀花植物。原產於北美洲、墨西哥、南歐等地，有一年生和宿根者，學名為 *Lupinus Spp*，英名 *Lupine*。

植株高自四〇公分至一五公尺。葉形掌狀，由五八小葉而成。莖直立，易分枝。自早春到晚春，在莖頂着花，形如胡蝶，花序總狀。暖地夏播則開花於冬天。可供切花及花壇栽培。

常見品種如下——

黃花羽扇豆 (*L. luteus*)

英名 *Yellow Lupine*，株高七〇公分左右的一年生草本，專供暖地早生栽培。

莖和葉均黃色，全株具有毛茸，春天抽着着蕾，開出黃色花來。蕾期中花瓣並不是黃色，萼為藍綠色，結實成莢果，內種子數粒。種子形扁而小，呈灰色雜有褐斑，質硬，南歐原產。

傘葉羽扇豆 (*L. Hirsutus*)

又名藍花羽扇豆，所以英名 *Blue Lupine*。和黃花羽扇豆同列為露地切花栽培用。株高約一公尺。

莖、葉毛茸較前種多，帶有白色的綠葉，有如張開的雨傘，故命名為傘葉羽扇豆。

花色以藍為主，另外尚有淡紅、白色等，獨缺黃色。花期三月。在暖地可行早播，供冬季切花。也是南歐原產。

宿根羽扇豆 (*L. Polypylus*)

英名 *Lupinus*：美國東部的宿根草花，耐寒性甚強，宜供花壇栽培。每葉聚小葉七、九枚，全葉葉柄很長。小葉為倒卵形或長橢圓形，表面平滑，背生毛茸。

花有藍、紫色，也有白花。花穗特長。適合高冷山地培育，喜寒冷氣候，不適本省平地栽培。

一年生羽扇豆以種子繁殖，宿根性可行分株繁殖。種子播種適期為十月，切花栽培如要提早開花，應在九月播種。


羽扇豆主根會深入土中，不適移植，慣行直播。園地做成四〇公分左右寬度的平畦，直播發芽後，株

距留二〇—三〇公分間苗。

基肥可使用堆肥和磷、鉀肥外，不必追肥，生長亦能繁茂。以往種子播種前，均使用水銀製劑消毒。由於毒性高，造成公害，少用為妙。代之以「萬力」消毒，效果並無二致。

土質中性為佳，排水良好，砂質壤土，栽培成績最優異。過於酸性的土壤，最好不要栽培。

羽扇豆虫害除蚜虫外其他很少見，惟病害容易發生。尤以連作地栽培，幼苗期易患腰折病，高溫多濕又易染莖腐病。其他菌核病、立枯病，也甚常見。大生、安收多、伏賜汀等藥劑，可收防治效果。蚜虫的發生，能引發萎縮病，應注意防患。



羽扇豆

意。

較大植株盆栽的灌水，因樹大而根部的吸收能力較差，向枝葉輸送水分之活力亦差，因之僅於根部灌多量之水，用處不大，要用噴水壺或噴霧器等常常噴霧水於枝葉。最好以自動噴霧方式為理想，以防止葉面水分的蒸發，補足其由根部輸送水分之不足，則有助於老樹盆栽的生育。

施肥：早月的盆栽，因從有限的盆土中吸收養分，以採用量少而含有多數養分的肥料為理想，以往以施用豆粕類的肥料為主，因而肥分有點不足。

施用粉末狀的肥料時，應如畫圓圈狀散布於根源與花盆中間，俟灌水時可溶入盆土，經腐熟後被其根所吸收。如欲求其有較快的生育時，要用油漬、魚渣等泡在水裏一、二個月的時間，使其充分腐熟後稀釋，於一周內施用一、二次。

冬季嚴寒之時，如果施肥，因根羣活動停止，不但不能吸收，相反的還可能損及根羣，因此在此時期最好少施肥。

換盆後十日內，最好也不要施肥，俟其根羣重新開始活動時，才漸漸的施用稀薄肥料、較濃厚肥料、粉末狀的肥料等之順序施用，則較安全而有效。

較大植株的盆栽，如果肥料的施用量過多時，會發生根腐，故其施用量應予調節。而幼樹則以施用較多量的肥料，始能有良好的生長。栽植時參用腐葉土，因腐葉土含有能直接作為植物營養的良好肥分，又腐葉土更能防止土壤的鞏固，並可作為肥料。