



鵝曲頸病

〔問〕：(一)我養的五〇〇多隻肉用本地鵝中，有三隻得了軟腳病，是否因鵝舍過分潮濕或營養不良所引起的？

(二)其中有二隻有歪頭現象，據說這是霍亂病的後遺症，但是鵝羣從未有得過霍亂病。這是何因？應如何防治？

(三)鵝有那些疾病？應作何種預防注射？

(四)肉鵝及種鵝各應如何給飼？(彰化縣北斗鎮大道里文苑路一一〇號許明圖)

〔答〕：(一)飼料中缺乏鈣質，或專飼以某一飼料以致營養不良，場地潮濕足部為濕氣所侵，均易發生軟腳病。所以飼料應平衡，場地需乾燥。晚餐尤應餵足。

(二)曲頸病的鵝應移到乾燥的地方，灌服礦物油或蓖麻油。保持棚舍的清潔衛生，並注意飲水、飼料及器具的清潔。避免吃腐敗的蔬菜或不潔的污水。本病的發生是由於病菌產生毒

素所致，應避免喂腐敗的物質。

(三)鵝的抗病力強，須定期實施禽霍亂菌苗預防注射。其他尚有眼病、痢疾、感冒、肺炎肝腫等病，但均易治療。

(四)肉鵝可用大雞飼料每隻每天二〇〇公克，青料任食。種鵝可用種雞飼料每隻每天二七〇公克，青料任食。(唐清考)

葡萄柚

〔問〕：(一)在北部地區可否栽植？葡萄柚又帶砂質的坡地土壤可否種植？

(二)正發葉的柑類苗木最好不移植，如果急需移植，必需帶土並選在陰雨季節栽植為佳。

(三)苗木可向「嘉義縣番路鄉江西村頂角仔三號其成新果園」洽購。每株約在一五、二〇元左右。

(四)北部地區因在秋冬至早春多陰雨，氣溫較低，日照不足，影響果實生育，往往會引起落果。(范念慈)

稻田殺草劑

〔問〕：我所種的稻田裡，長有水荃仔、公皮草、螢蘭，我施用「馬上除」、「一克草」等殺草劑均無效。現已長滿水田。請問應如何殺除？(台中縣大甲鎮中山路二段一九九巷

五號陳坤城

〔答〕：野茨松(水荃草、水荃仔)、公皮草(鳳梨草)、螢蘭(小荳仔、水荃仔草)，均為多年生雜草。目前在市面上出售的稻田殺草劑，如「馬上除」、「一克草」、「掃丹」、「掃丹M」、「多谷」等，對這三種雜草的殺草效果差或無效，所以田面發生這三種雜草愈來愈多。

最近新推廣的一種中期殺草劑「草霸王」液劑(Asagran)，對此三種雜草的殺草效果甚佳，可以採用此藥劑來殺除。

「草霸王」液劑，除對水稗及滿天星等雜草無效外，對大部分一年生或多年生雜草都有效。但它是屬於中期殺草劑，須等到插秧後第一期作三〇、四〇天，第二期作二〇、三〇天時施藥，才可發揮理想效能。

施藥前一天排乾田面積水，並等雜草莖葉上水滴完全蒸發後才施用。每公頃施藥量為三公升，加二〇〇倍水稀釋後，用高壓式噴霧機噴灑於雜草莖葉上。施藥後三、五天田面須繼續保持排水狀態。如插秧後不久先施用一次普通殺草劑，然後再施用一次本劑最理想。

(林寶鑫)

稻熱病

〔問〕：最近數日，氣候變化多端，導致我家農田六號品種稻苗發生嚴重的稻熱病。三、四天光景病害蔓延及一甲多的稻苗。重者葉脈全枯黃，只剩一小撮；輕者葉脈上也有無數小斑點。請問：

(一)我家農田每年都會遭受稻熱病侵害，是否與稻種有關？或是與防風

美國Millmaster-Onyx公司榮譽出品

歷史最久，品質最純，活性最強，效果最優

1. 植物生長荷爾蒙 SNA 98%
2. 植物生長微量要素 ME 33
3. 水果保鮮劑 NF 58

原體及成品現貨供應 說明書備索附回郵及信封



台灣總代理

大三晃貿易有限公司

台中市大公街27號 TEL. (042) 264446·267489