

蒲公英小巧可愛

洪丁興

反捲而區別之。
officialine Weber), 以其總苞外片

性狀——為多年性草本，全株流白色乳液。根粗大為直根系，深入土中。莖極短，不出地上。葉均為根生，呈匙生型，質柔軟，長倒披針形，長一〇~二〇公分。葉緣呈倒向之羽狀深裂，裂片三角狀，葉基狹翼狀，無葉柄。

花於春天二、三月開始開，花莖長一五~三〇公分，單生一頭花，於上午開，午後閉合，即具有睡眠運動，二~三天就會凋謝。頭花僅由黃色舌狀花所成，徑約三公分，總苞呈杯狀，總苞片綠色，線狀披針形，呈二列，舌狀花冠先端五齒裂，五雄蕊，聚藥，一花柱，柱頭二裂。瘦果微細，紡錘形，長三公厘，具有長柄的冠



蒲公英

蒲公英 (Dandelion) 又叫做蒲公英，屬於菊科植物。為春天的一種代表野花，小巧可愛，且能供食用、藥用而馳名。又因為其特殊生態，自古一直到現在常被列為教材，在各級教科書中，頗為常見。因此為大眾所熟悉，人人所喜愛。

蒲公英在台灣有兩種：一為台灣固有的台灣蒲公英 (Taraxacum formosana Kitamura)，僅見於通霄以北海邊沙地，沿海向陽之地，如新竹、紅毛港、淡水、石門、金山、花蓮等地。一為原產歐洲，最近歸化於台灣的西洋蒲公英 (Taraxacum officinale Weber)，以其總苞外片反捲而區別之。

栽培——(1)採掘野生幼苗，移植庭園定植，或採成熟種子播種。但要注意其羣落的維護，族羣的保存。(2)採苗定植或播種，均可於春天三、四月行之。(3)以肥沃沙質壤土，向陽日照充足的庭園最好。(4)生育期中施用追肥，可使葉長大而幼嫩。

採收——(1)葉要在春天，未開花前採收，才無苦味。(2)花在春、夏二、五月採收。(3)根要在秋冬選植株壯大者，掘起洗淨曬乾，保存於置放砂膠乾燥劑的容器內以防生霉。

利用——(1)幼葉可做成沙拉生食或炒食、煮湯均可。(2)花可油炸或煮食，也可做酒。(3)根切成薄片，可調味炒食。(4)根或全草可作藥用。

年青的一群，熱誠的服務！

美國 Greenwood Chemical Company 公司
出品生長調節劑

高產素

98% 水溶性粉劑

促進南瓜結果提高品質，
防止梨落果調節鳳梨生長。



瑞典 Keno Gard 公司出品

新靈

SYLLIT 65% 可濕性粉劑

防治：梨、蘋果黑星病之
真菌性病害。



英國 A.H. MARKS 公司出品
蕃茄旺 蕃茄，茄子生長素
2,4-地鈉塩 除草劑



英國 Burts & Harvey LTD. 出品
克草本 Dalapon 85%
除草劑



西德 VAW 公司出品

新力

STULLN 80% 可濕性硫黃 殺菌劑



比利時 UCB 公司出品

新果生

80% 殺菌劑

台灣總代理：德城行有限公司 台北市仁愛路二段72-9號二樓之一