

不大。

(三)發射注鎮靜劑的槍，請向獵具行詢問。至於難產或動手術時要使用中時間或長時間作用類藥，麻醉效果較好。(廖貴燈)



### 鹿的鎮靜劑

〔問〕：我養有水鹿數隻，請問

(一)在搬運抓鹿，難產處理或割茸時，一般均以捆綁方式，不但易生危險，也很麻煩。是否可以注射鎮靜劑？鎮靜劑何處有售？應如何注射？

(二)注過鎮靜劑割下的鹿茸，食用後對人體有無不良影響？  
(三)電視上動物奇觀影集中，抓動物均以槍發射注鎮靜劑，那種槍何處可購得？(台東市正氣路二五六號彭春男)

〔答〕：(一)除捆綁方式外，也有人使用鎮靜劑做靜脈注射，可使用硫代巴土納(Thialbarbitone Sodium，Kemithal Sodium)用十分溶液靜脈注射，用量為每磅體重二五毫克，歷時三〇~六〇秒注入，可麻醉十五分鐘。因恢復期極快，對鹿健康影响不大。但是有惡病質的鹿，對這類藥劑敏感性大，甚至有中毒的危險。  
(二)注過上述鎮靜劑後，割下的鹿茸可能含有極少量藥，但對人體影響

〔問〕：(一)鮑魚姑太空包所用的木屑，以何種為佳？  
？太高或太低時，應如何調整。  
(四)太空包裝好後，應如何殺菌？

(台北郵政信箱十九~二七四號鄭正裕)  
〔答〕：(一)栽培鮑魚姑的木屑，以一般雜木為主，最好能加上二五% 油桐屑。

(二)鮑魚姑的菌絲，在低營養狀況下生長良好，所以木屑與營養量的比例，常在十比一或者更低。營養料的種類，除米糠與碳酸鈣外，再加用少量麵粉或玉米粉。

(三)適宜PH在五·八~六·〇。太高時，用十分之一N的塙酸調整，太低用十分之一N的氫氧化鈉調整。  
(四)太空包滅菌處理過程不可加壓，以八五度C的中心溫度加熱三小時為宜。(杜自強)

### 草莓肥害

〔問〕：(一)我種植的草莓，新發葉片葉脈變為深黑色，葉片外圍大約〇·二公分寬的地方呈乾土黃色，一個月之內就乾死了約十多株。是幼

施肥過多或其他因素所引起？  
(二)原來的行株距為三〇公分×三〇公分，現在一株發生四~五株，可否施行分株？(彰化縣員林鎮惠來里惠來街四八號謝蕭味)  
〔答〕：(一)依來函所述，是肥料施用過多所引起的肥害。應多灌水，使肥料能流散。  
(二)防治法為及早摘除病葉，噴布「好速殺」，病徵為葉片先發生約三~四公厘不規則紫褐色不鮮明的斑點，然後全部呈暗褐色而枯死。

肥料施用過多也容易引起「葉枯病」，病徵為葉片先發生約三~四公厘不規則紫褐色不鮮明的斑點，然後

全部呈暗褐色而枯死。  
(三)防治法為及早摘除病葉，噴布「好速殺」，另行栽植。(鄭希煌)

### 火雞配種

〔問〕：我在四年向南港農會購進火雞一對，已飼養一六年。現在公雞二八斤，母雞九斤，但二者還未曾交配。請問：應如何使他們交配？(台北縣汐止鎮義民里中正路一三八號吳朝發)

產蛋，一隻公火雞可與十五隻母火雞進行交配，而且公火雞體重不要超過母火雞體重二倍以上。  
(四)你的公火雞體重大於母火雞十九斤，可以人工授精補救(方法與雞相似)，或以體重一八斤左右的公火雞自然配種。  
(五)母火雞發情時才肯接受公火雞配種，所以母火雞不可餵得過肥，平時需補充青飼料，並注意不可缺少水。(唐清苓)

美國Millmaster-Onyx公司榮譽出品

歷史最久，品質最純，活性最強，效果最優

1. 植物生長荷爾蒙 SNA 98%
2. 植物生長微量元素 ME 33
3. 水果保鮮劑 NF 58

原體及成品現貨供應 說明書備索附回郵及信封



台灣總代理

大三晃貿易有限公司

台中市大公街27號 TEL.(042)264446-267489