


66年無霜系列

# 頂好

“頂好”不只是我們自己說好，連外國人都稱讚的大同冰箱！

堂堂以大同牌外銷，佔全國95%，擁有最完整的系列，從60~575公升的19機種，容量最大，冷凍力超強（可低達零下34℃），品質第一，服務最好。



〈全國首創三門式〉



榮獲全國品質管制經濟部長獎



## 大同冰箱

歡迎駕臨大同之店、服務站洽購。



### 如何增加

## 水稻單位面積產量？

如何提高水稻單位面積產量，降低生產成本，仍為當前農業推廣的課題。要增加單位面積產量，除依照農業改良場推薦的方法外，由於土壤的老化，有機質的無法利用（因勞力缺乏，耕耘

機無法將稻草型入土中，而把它燒掉或賣出），因此沒有辦法達到增產的目標。

樹林鎮則安里水稻綜合栽培研究班於五月分班會時，特別以「如何增加單位面積產量」為題，熱烈討論。

劉得結（班員）：防止水稻倒伏是增產的重要關鍵之一。水稻長至七分熟時，常因倒伏而減產一成以上，依我的經驗，預防方法有兩點：

（一）我的水田肥沃度不同，因此必須作合理的施肥。我多用磷肥及鉀肥

，少用氮肥，基肥以過石二四〇公斤、氯化鉀四〇斤、硫酸一〇〇〇公斤充分混合後，於插秧前三天撒布田裡。

第一次施追肥，硫酸銨四〇公斤於插秧後十天施用；第二次施追肥，將硫酸銨一〇〇公斤，氯化鉀四〇公斤混合後，於插秧後三〇天施撒；穗肥在幼穗形成〇・二公分時，依葉色濃淡而決定，通常我都不施。

（二）插秧後四十五天左右，用二四〇D可濕性粉劑加水五千倍，每公頃用藥量一二〇公分，然後均勻的噴於

稻株上，可強化稻桿，不易倒伏，又可收殺草及預防紋枯病的作用。

謝義元（班員）：我的水稻在初期發育旺盛，但到了生育後期，稻葉發生斑點，下部葉子枯黃，稻穗稔實率很差。後來請教推廣股長，他說這是土壤多年沒有翻犁風化而引起老化的原故。改善的方法有四：

（一）二期作收割後，翻犁使其風化，促進無效養分有效化。

（二）把心土打破，提高透水性。

（三）實行客土，或每分地施用堆肥五〇〇公斤。

（四）每分地施矽酸鈣一六〇公斤，氯化鉀三〇公斤，連續施用五年，就可改良土質。

去年二期作時，我先選生育不良的二分地，施用堆肥一千公斤，矽酸鈣三二〇公斤，氯化鉀六〇公斤，結果收穫量比一般水田增加十四%。

林火旺（班員）：我建議改良場將各地水田抽取土樣，化驗土壤所含成分，提供給農友作為施肥參考。

賴喜（班員）：二期作我栽植的水稻，長至七八分熟時，發育還很正常，可是一旦遇到東北季風來時就開始枯萎。據指導員說是菌核病，而目前並無特效藥可防治，請有關單位及早研究藥劑對症下藥。

石沿春（班員）：依我的經驗是水稻將成熟時，田面勿使過乾，經常保持濕潤就可補救。

王永通（主席）：去年一期作，我將種有紫雲英的一分地水田，一半用曳引機深耕八寸，將紫雲英葉深埋土中，其餘一半以普通耕犁機耕松的結果，曳引機耕區增產十六%。本會特別購買一台五六馬力曳引機，準備為農友實施深耕服務，請大家多多利用。（陳榮淵）