

如高推選一號，來縮短本口生育日數，減少損失。(陳添來)

芥菜品種

〔問〕：(一)在夏季栽培芥菜何品種較適宜？「厚莢」品種應在何季節栽培？何處可購得比較純的種子？

(二)夏天種植大蔥，如何防治枯爛？(桃園縣蘆竹鄉大竹村二二鄰三一號陳朝根)

〔答〕：(一)宜選「薄甲」品種較

宜，例如竹仔菜及扁甲，因該種較抗熱，適於小株栽培，生育迅速。

厚甲品種例如肉甲及圓甲等宜以大株栽培，供做加工原料。在冷涼的氣候才能生產佳品，所以一般作為二期水稻伴作。

一般種子行出售的種子純度不高，多在產地自行留種，如未留種，可向「台北市迪化街一段八十六號台農企業公司」或「三重市重新路四段興農種子行」購買種子。

〔問〕：大蔥栽培，以桃園地區氣候條件八月下旬至九月中旬為播種適期，育苗日數約八〇天左右，所以一般都在十二月定植，很少在夏季栽培。

但如土地排水良好，可提早於八月上旬播種。為提高育苗率，必須選擇排水良好富有機質的土壤為苗床，同時在驟雨來臨前，使用PE網覆蓋以免苗木沖刷。

育苗期每隔十天噴射「萬力」可濕性粉劑二、五〇〇倍液，噴藥除必須加用展着劑，為了管理方便，宜採用條播，條距九至一〇公分，如發生前馬須在「萬力」中，再加用「萬靈」噴射，可減少腐爛。苗木應多施過磷酸鈣以利根部發育，提高

着水分吸收力，增加抗病力。

本圃應選緩坡地栽培，以利排水栽培時多施腐熟堆肥，覆蓋根部，並多施過磷酸鈣及草木灰，提高抗病力，減少腐爛。施藥與苗木相同。(王進生)

西瓜裂果

〔問〕：前幾年我種了五分地的小鳳西瓜，到成熟期時，沒下雨也沒灌溉，不知為何却會破裂，連那些尚未成熟的西瓜也一樣，每天破裂的數量大約在一〇〇台斤左右。是何原因？應如何防止？(雲林縣北港鎮口庄五六號楊江形)

〔答〕：西瓜裂果，主要由於土壤水分不均勻。即在果實發育期，土壤長久乾旱後，遇雨或灌水，或因降雨或灌水過多，土壤太濕皆易引起裂果。所以在西瓜發育期，須經常適量灌水保持濕潤狀態，不使驟乾驟濕。又紅蜘蛛為害果實也能引起裂果，應加防治。(郁宗雄)

紫菜增產

〔問〕：紫菜繁殖用何種樹枝較適宜？應如何增產紫菜？(苗栗縣公館鄉館南村四四號邱宏江)

〔答〕：樹枝可就地取材，以分枝愈多的愈佳。但以不容易折斷流失為原則。增產紫菜的方法為先選擇紫菜生長期(因地而異)，在紫菜生長地區施行如下的方法：

(一)把舊魚網、竹竿、樹枝固定或覆蓋在紫菜生長的岸石上，等到紫菜苗長出來後，再移到離岸地方。利用浮球讓附有紫菜苗的魚網等浮在海面上，使紫菜繼續生長。

(二)把竹竿或樹枝直接插在岸邊，使漂浮海水中的孢子附着(陳勝香)

美國Millmaster-Onyx公司榮譽出品

歷史最久，品質最純，活性最強，效果最優

1. 植物生長荷爾蒙 SNA 98%
2. 植物生長微量要素 ME 33
3. 水果保鮮劑 NF 58

原體及成品現貨供應 說明書備索附回郵及信封



台灣總代理

大三晃貿易有限公司

台中市大公街27號 TEL. (042) 264446-267489



嘉新麵粉飼料油脂股份有限公司

徵

養豬用 養雞用 養鴨用

配合飼料 經銷商

台北市林森北路372號六樓 電話：531-6320-5 531-0270-1 5624047