


日本岡恒牌高級園藝工具

鋼質最優秀！設計最實用！

其他：大型鋏、葡萄鋏、高枝切鋏、刈込鋏、洋蔥鋏。



請認清商標，謹防假冒。

原裝進口，歡迎選購

經銷處：新高貿易股份有限公司

台北市峨嵋街68號 電話：3314190・3713208 郵政台北市15195號

農業周刊

——豐年的姐妹刊物——

- 報導農業新知識、新消息，是國內權威農業新聞刊物。
- 分析農產品供需的最新動態，推廣進出口貿易機會。
- 介紹試驗研究成果。
- 內容與豐年半月刊完全不一樣，適合農業及工商貿易、學術各界人士閱讀。
- 爭取時效，每星期一出版。全年52期，訂費100元。

豐年社農業周刊
台北市溫州街14號
郵政畫撥5930豐年社

椰樹不結果

無子西瓜用的，應先將種到播種箱，靠接時連根挖取，和西瓜靠接後，再栽到育苗鉢或育苗袋育苗。(邵宗雄)

〔問〕：(一)本場土質屬粘土，雨季後非常堅硬，在五五年種植椰樹三十餘株，雖未當施肥，大多數發育尚佳。但至今只有三株開花結實，其他或開花不結果或根本不開花。請問是何原因？

〔答〕：(一)近兩年來，椰樹葉子除嫩葉外，大多變黃而有黑斑。應如何防治？(高雄市民族一路四六〇號何翼華)

〔答〕：(一)本省栽植椰子可椰子通常植後八九年，應可開始開花結實。一般延遲開花原因有二：(1)生育地條件太差，以致植株發育不良。(2)品

種差，結實量少，且開始結實年度延後。前者可用施肥法補救。後者是遺傳因素，無法可想。

〔答〕：(一)黃葉現象應為淡圓介壳虫危害所引起的。可用「大滅松」希釋一、〇〇〇倍混合四〇〇倍夏油乳劑，每隔三星期噴一次，連續噴三次。(劉正平)

板栗施肥

〔問〕：(一)板栗結果期遇雨，為何嚴重落果？又應如何施肥才可促進結果？

〔答〕：(一)一熟葡萄尚未採收完畢可否把葉片除掉？二熟葡萄應如何剪定？(苗栗縣卓蘭鎮內灣里東盛十二號林柏宏)

〔答〕：(一)板栗屬於溫帶果樹，

貴地氣溫高，板栗易徒長，多雨期更易落果。落果與樹齡、授粉等的關係也很大。

大致在十二月前施基肥，以雞糞、豆餅等有機質為主。三月間及七月底(果實採收後)追施化學肥料。化學肥料應以磷鉀肥為主，少施氮肥，才可促進結果，避免徒長。

〔答〕：(一)一熟葡萄尚未採收前不能除葉，以免影響一熟葡萄的果實，及二熟葡萄芽體的成長。二熟葡萄剪定，通常在第十二、十五葉片間實施摘心，剪定標準以枝條顏色(略褐色)，及主芽是否充實飽滿作決定。(李信芳)

蘋果根朽病

〔問〕：我在梨山松茂地區，種植數百株蘋果，現已九年生。但自六

年生開始，逐年皆有死亡，今年有增多的趨勢。但樹皮仍呈青色，再過一段時期，樹枯萎而死。檢查枯株發現根、主幹底部及主根全部腐爛，腐敗處寄生有一種白色介壳虫。這種現象是否是腐根病？或是由白色介壳虫為害所引起？應如何防治？(台北市吳興街二八一巷三六號萬正雄)

〔答〕：(一)據來信所述，可能是根朽病，白色介壳虫只是附生其上，不是致死原因。

根朽病尚無藥劑防治，但可用曝根法，就是將罹病株基部主根四周的土挖開，使主根露出，病原菌經日晒後，會自行死亡，不致向上蔓延，病株可逐漸恢復。挖開的土，含有病菌，未經消毒不可再蓋上。

曝根植株容易受風吹倒，須用竹竿作支柱。(孫守恭)