





—— 上：使君子，中：洋繡球，下：大理花（張近強） ——

使君子花開鮮艷美麗

林樹之

使君子屬於使君子科，學名是 *Quisqualis indica* L. 俗名山羊屎。為蔓性不定形灌木，作蔭棚為上選材料。

在台灣約於十一月開始落葉，逐漸落至翌年的一、二月，如生長環境欠佳，幾乎全部落光，如生長環境好則可保留部分綠葉。冬季南部恰值乾旱，如需保持綠葉，可注意灌水。北部冬季雨水尚多，可不必灌水，這時可愛的鮮紅色花亦隨之漸次凋落，利用此特性可以作為蔭棚。夏天葉子茂盛可以遮蔭，冬天落葉後可以吸收溫暖的陽光。

使君子在每年三月間開始出芽，表現出一番新氣象。到了五、六月間氣溫漸增，即漸次開出鮮艷的紅色頂生穗狀花序，莖細長呈圓筒形。達盛開時節絳紅一片，鮮艷美麗，非常好看。

台灣處於熱帶及亞熱帶氣候，陽光高照，晴天中午時分，天空時常形成火傘一把，其他花卉走避，無法抵抗，然而使君子在此環境下仍能生長茂盛生意盎然。南部雨季雨量充沛，生長更為茂盛。茲將其繁殖及栽培管理方法介紹如下，供愛好者參考：

播種：把不實種子及其他夾雜物除去，種子經精選後即可播種。它是耐熱性植物，所以在台灣適宜春播。苗床可採用水稻育苗框（木製或塑膠者均可），框底每隔一公分鑽以一公釐的小孔，底部鋪用細篩篩過的砂質壤土，上層覆以細河砂。播種後再蓋細砂一層，以不見種子為限，鎮壓後用細孔噴壺噴水，覆蓋塑膠布，土壤保持濕潤。

扦插：選二至三年生向陽無病虫害的優良枝條，用銳利修剪剪取長約十五公分插穗，上端削平，下端削成馬耳狀扦插，三分之二入土，三分之一酌留土面，直立或傾斜均可，插後宜用塑膠布覆蓋。如作大量繁殖可開築苗圃，苗圃要選擇灌溉便利的砂質壤土，經規畫妥當後即可開築苗床，苗床寬約一公尺，排列整齊。

主道可視情形而定，通常約一至二公尺，如交通工具為汽車，就必須加倍，至少要四公尺以上，支道（畦間距離）約三〇公分。主道應留迴轉車輛的圓環，以利車輛迴轉進出。

花壇植物

• 舒麗菊

西洋白花菜

西洋白花菜又名醉蝶花，學名為 *Cleome Spinosa*，英名爲 Spider Flower，是白花菜科 (Capparidaceae) 中半耐寒的一、二年草本花。原生於熱帶美洲，植株高度約爲三、四英尺，種植距離最好是十八英寸。莖直立有毛，葉片中綠色，由五、七個長橢圓形的小葉片組成。

花爲白色，其上並染有粉紅色，有花瓣及很長的雄蕊構成蜘蛛似的花頭，此爲特殊而引人之處，花的直徑有四英寸。植株叢生，適宜種植於花壇內，作爲點綴。亦可盆栽，置於溫室內欣賞。其中最著名的變種有：開白色花的 "Helen Campbell"，開粉紅色花的 "Pink Queen"，開直徑有十二英寸黃色花的 "Golden Sparkle"。

以播種法繁殖，三月溫度約爲攝氏十八度，此時播種最合適。當幼苗長到足以直立時，移植於三英寸半的花盆內。如果想種於溫室，使在夏天開花，則移於裝有盆栽用混合培養土的六英寸盆內。假若要種於花壇內，庭園中，須在五月由溫室移出前，先置於冷床上，使其耐寒力增加。使用排水良好，富含腐植質的肥沃土壤，種植於充滿陽光的位置，則可在七月開出具有香味的花朵。花期長，一直到霜期來臨才會結束。

病害很少，但植株在幼小時，易受蚜蟲爲害，使幼株變型扭曲，可用馬拉松或煙精劑 (尼古丁) 噴洒殺除。

繁殖：於雨季中擇二、三年生枝條，環割表皮，用粘土或苔蘚包裹，外用塑膠布包半，繫紮處距環割處各十公分，發根後剪離母株即可定植。

分蘖育苗：先覆土在根株的幹部或橫走的根，使其生葉且帶根劈下，培育於苗床或花盆內成苗。發芽經劈下後，剪去全部綠葉及頂芽，栽後注意澆水，保持土壤濕潤爲要。俟新芽長出，約半年後即可定植。

栽培管理：使君子雖對土壤不甚選擇，但一般以肥沃壤土生長快速，容易成功。栽爲庭棚，定植處如土壤不良，則必須客土改良，否則生長緩慢、不易成功。植後土壤宜保持濕潤，莖莖需立支柱 (竹桿即可) 用塑膠帶綁縛，讓它順利的爬到架上。

使君子萌芽力強，希望長成自己喜歡的形狀，必須加以修剪以增美觀。成長後生長力迅速，植株較重，故竹架支柱宜用鋼筋三合土柱，噴漆三角鐵梁的堅牢棚架。如鋼架上的枝條宜用尼龍繩固定，以防颱風侵襲。



西洋白花菜 (阿那)