

花壇植物 · 舒麗菊

西洋白花菜



西洋白花菜 (柯那)

西洋白花菜又名醉蝶花，

學名為 *Cleome Spinos*，英名爲 Spider Flower，是白花菜科 (Capparidaceae) 中半耐寒的一、二年草本花。

原產於熱帶美洲，植株高度約爲三、四英尺，種距距離最好是十八英寸。莖直立有毛，葉片中綠色，由五、七個長橢圓形的小葉片組成。

花爲白色，其上並染有粉紅色，有花瓣及很長的雄蕊構成像蜘蛛似的花頭，此爲特殊而引人之處，花的直徑有四英

寸。

植株養生，適宜境植於花壇內，作爲點綴。亦可盆栽，置於溫室內欣賞。

其中最著名的變種有：開白色花的 "Telen Campbell"，開粉紅色花的 "Pink Queen"，開直徑有十二英寸黃色的 "Golden Sparkle"。

以播種法繁殖，三月溫度約爲攝氏十八度，此時播種最合適。當幼苗長到足以直立時，移植於三英寸半的花盆內。如果想種於溫室，便在夏天開

花，則移於裝有盆栽用混合培養土的六英寸盆內。

假若要種於花壇內，庭園中，須在五月由溫室移出前，先置於冷床上，使其耐寒力增加。使用排水良好，富含腐植質的肥沃土壤，種植於充滿陽光的位置，則可在七月開出具有香味的花朵。花期長，一直到霜期來臨才會結束。

病害很少，但植株在幼小時，易受蚜蟲爲害，使幼株變型扭曲，可用馬拉松或煙精劑 (尼古丁) 噴洒殺除。

底孔用碎瓦片鑿妥，然後裝入肥土或培養土，照前述方法作好播種扦插育苗。如新購花盆在使用前須先浸水，舊花盆則免，或用塑膠袋、廢沙粒油煙亦可代用。

鑿條：擇一、二、三年生靠近地面枝條，壓埋土中處環割，擇肥沃或腐植質土蓋埋，以雨季前行之較佳。俟生根後才可與母株剪斷，再行移植。視苗大小可酌情採用大小罐，挖苗時鑿背朝向苗木而鑿面則反向苗木，如此作成土盤，移植栽培易於成活。

高壓：於雨季中擇二、三年生枝條，環割表皮，用粘土或苔蘚包覆，外用塑膠布包半，繫紮處距環割處各十公分，發根後剪離母株即可定植。

分蘖育苗：先殺土在植株的幹部或橫走的根，使其生葉且帶根劈下，培育於苗床或花盆內成苗。發芽經劈下後，剪去全部綠葉及頂芽，栽後注意澆水，保持土壤濕潤爲要。俟新芽長出，約半年後即可定植。

栽培管理：使君子雖對土壤不甚選擇，但一般以肥沃壤土生長快速，容易成功。栽爲陰棚，定植處如土壤不良，則必須客土改良，否則生長緩慢、不易成功。植後土壤宜保持濕潤，莖葉需立支柱 (竹桿即可) 用塑膠帶綁縛，讓它順利的爬到架上。

使君子萌芽力強，希望長成自己喜歡的形狀，必須加以修剪以增美觀。成長後生長力迅速，植株較重，故竹架支柱宜用鋼筋三合土柱，噴漆三角鐵架的堅牢棚架。匍匐架上的枝條宜用尼龍繩固定，以防颱風侵襲。