

花壇植物·美人蕉

益進林

美人蕉學名·Canna iridiflora, Ruiz et Pav. 英名·Indian Shot, Canna indica. 屬曼華科，原產西印度。

為半耐寒性常綠多年生塊根花卉。花語：表示尊敬之意，祝福你美滿快樂。

美人蕉一名曼華，夏秋間開花，花色紅、粉紅、橙黃、白、黃及嵌雜色，適合於花壇栽植。

美人蕉原產熱帶地方，需高溫及日照充足之處，土質不拘，惟以濕潤而富含有機質之土壤為佳。

美人蕉主要以分株法繁殖，溫帶氣候因冬季需掘取塊根，可切斷分別作為繁殖體。暖地則可連地上莖和匍匐莖，同時切離分株。

栽植期暖地在三、十月均可，溫帶地區則以四、五月為宜。美人蕉需水多，尤以酷暑間開花，消耗水分更多，故栽植地如非沿澤附近，則應勤加澆水。

開花期間每間



美人蕉 (張仁川)

特別是稀珍斑紋種，最忌直射光線，同時注意勿使暴雨打擊，施行分株後之二週間，多加細心照顧，使新株充分適應而成活。

播種法——棕竹類通常為雌雄異株，常不結實，如有結實，採到的種子也極為稀少。採充分成熟，完全受精之種子，進行播種，每一植株播入三、五粒。

以分株栽植之植株，第三年可望開花，如施以人工授粉，翌年春有果實成熟。果實橢圓狀球形，果皮肉質。內果皮柔軟，初為綠色成熟時變紅色，每果含有種子一粒，此法於育成新品種時採用。

高壓法——多用於高價珍種，植株之下葉枯落，莖幹光禿，僅莖頂有葉簇生，株形不良。在幹之適當部位，施行一公分寬之環狀剝皮，周圍裹以水苔，外面用透明塑膠布包裹，經一年餘之時間，始萌發新根，根伸出水苔之外，即可切取栽植。空中壓條時期，最好在四、五月間，水苔須經常保濕潤，時常澆水。

栽培管理：棕竹類為亞熱帶原產，本省高溫多濕，氣候適於栽培。培養土以普通排水良好，好土壤即可，生育強健，極少病虫害。棕竹科屬單子葉植物，皆為鬚根系，沒有主根，盆栽時以選用長鉢或大口徑盆為宜。

素燒盆通氣性及透水性較佳，但易失水乾燥，用於室內觀賞者，風格亦差，故以採用釉盆為宜，尤其珍貴之斑紋種，更須配以適當的釉盆。

棕竹之斑紋種，猶如蘭類的葉藝線蘭，在栽培上自不能與普通草蘭一般看待，必須周到管理。斑紋種及葉藝種之培養土，通常用河砂（或蛭石），混以遲效性的有機質肥料。基肥以油粕或魚肥混合一、二成骨粉，用水調和，製成手頭大的團粒，以三、五個放置盆內四周。另以油粕或魚肥一三〇克，加入一公升水，使發酵成液肥，加水稀釋作為追肥。

作為園景栽植者，於四、五月間，在植株周圍挖溝，施以雞糞，用量視植株大小，生育情形，斟酌決定。強烈日光直射，常引起葉燒，尤以斑紋種最忌強光，此等觀葉植物一旦發生葉燒，觀賞價值盡失，最好在陰棚下培養，較為安全。平時之澆水，不可缺少，以保持盆土表面濕潤為度。



棕竹盆栽