

甜瓜落果

問 (一)爲什麼香瓜、梨甜瓜幼果長至拇指大時，就黃萎落果？(二)黃香瓜、梨甜瓜果臍內出，是何原因？（雲林縣崙背鄉崙南三〇號廖樹枝）

答 (一)引起甜瓜（包括黃香瓜、梨甜瓜、洋香瓜）幼果黃萎落果的原因有：(1)栽植過密，莖蔓發育過於旺盛。(2)氮肥施用過多，莖蔓發育過於旺盛。(3)開花結果期灌水或降雨過多，土壤太濕、排水不良，日照不足，溫度過低。(4)開花期缺少蜜蜂授粉，或濫噴殖物荷爾蒙。(5)病虫爲害根、莖、葉，使植株營養不良。(二)甜瓜臍部內出，是品種特性。（郁宗雄）

芒果樹蛀虫

問 (一)我在五年前與一位住在南勢竹下庄仔的好友，同時栽培蜜絲楊桃。我的發育良好，但是我好友的蜜絲楊桃，却在今年忽然間連續枯死十幾株。請問這是什麼原因？(二)我栽培的愛文芒果先是上面接種的莖皮處由青轉黑，然後皮破流膠，漸漸枯死。請問這是何病？應如何防治？（嘉義縣義竹鄉龍腳村八九號翁章）

答 (一)楊桃枯死可能是浸水過久，引起根腐病。應加强排水，使土壤空氣流通，維持根系正常呼吸。(二)芒果枯死，可能與蛀虫有關。請注意流膠處，是否有虫排洩的顆粒狀物質。如有此物質，就可證明是虫害致死。

可噴一、〇〇〇倍「加拔山」或一、〇〇〇倍「涑滅松」防治。也可在樹幹部環割三～四寸寬的五〇倍「亞素靈」，「亞素靈」滲透入樹體組織內，可將死蛀虫，藥效可維持達三～四個月，效果顯著。但此藥劇毒，不可觸及皮膚。（張振宙）

芒果樹乾枯

問 我家的兩棵芒果，原本春梢茂盛，但這一個多月來突然發生乾枯的現象。葉片先從葉尖枯起，順着葉脈直到葉梗，然後脫落。連新發的嫩葉也不例外。同時樹枝也同樣由頂端枯起。這樣下去，慢慢地全株就會枯死。請問應如何挽救？（雲林縣虎尾鎮下南四五號郭等）

答 這種現象，可能與土壤中某種成分突然增加有關。例如施肥過多，大量增加石灰或其他物質等。補救的方法，是將積水不斷排除，使過多的物質藉排水而減少，爲害可減輕。現在正值雨季，雨水很多，如能把排水溝做好，可使雨水不斷產生沖洗作用。（張振宙）

月桃外銷

問 (一)本省原產的月桃有幾種？可採種外銷的是那一種？有何特徵？(二)月桃適於何種土壤？應如何栽培管理？（台南縣白河鎮關嶺里三號詹煌助）

答 (一)有三～四種。一般種子當中藥，外銷日本的是原產北部山野的「正月桃」。「正月桃」花朵外邊乳白色，花穗垂下，葉片可供包裝魚、肉。(二)凡排水良好的任何土壤，均可生長。在春季三～四月時可採地下莖，以六寸×六寸距離栽培。月桃性質強健，可採粗放方式栽培。施肥以三要素混合，並加强氮、鉀的量。乾旱時，須適量灌水。（黃敏展）

蔬菜溫室栽培

問 我想在溫室中栽培胡瓜、番茄及甜椒，請問授粉及結果會不會正常？（雲林縣古坑鄉荷苞村三七號陳樹塘）

答 胡瓜是雌雄異花，溫室栽培，須於上午六～七時實施人工授粉，或在溫室內飼養蜜蜂作爲授粉昆虫，才可結果。



日本岡恒牌高級園藝工具
鋼質最優秀！設計最實用！
其他：大梨鋏、葡萄鋏、高枝切鋏、刈込鋏、洋葱鋏。
採果鋏 生花鋏
盆景鋏
高枝剪（阿武隈川式）
接木刀
剪定鋸
剪定鋏
請認清商標，謹防假冒。
原裝進口，歡迎選購
經銷處：新高貿易股份有限公司
台北市峨嵋街68號 電話：3314190・3713208 郵撥台北市15195號

番茄爲雌雄同化，除溫度在十五度C以下及二〇度C以上時，須使用〇・一五%番茄生長素溶液五〇～一〇〇倍處理化穗外，皆可自交授粉。而溫室栽培能以人工控制溫度在二〇～二五度C，所以無此顧慮。

甜椒爲雌雄同花，能自交授粉。但在一〇～一五度C會引起單爲結果，果實內無種子。而溫度高於三五度C時，有果率很差。在適溫下的溫室不致發生此現象。（王進生）

甘藷簽害虫

問 我在三月上旬採收台農五十七號甘藷後，立即作成甘藷簽，經過充分乾燥才收藏起來。最近發現有象鼻虫及擬穀盜兩種害虫發生，將甘藷簽啃細成粉末狀。請問應如何防治？（雲林縣水林鄉海埔村八十五號陳水柱）

答 甘藷簽害虫的防治方法爲：

1. 新簽入倉前，以五〇%無臭「馬拉松乳劑」四〇倍液噴佈倉內四壁及器具、容器等。

2. 入倉後，發生虫害時，以一%無臭「馬拉松淀孕粉劑」均勻拌和於乾簽中，用藥量爲甘藷簽量的一千五百分之一。以後每隔一個月，以同樣方法處理表層深約一〇公分範圍的甘藷簽。

3. 如爲可密閉的獨立倉庫，且距離住宅、畜舍等在二公尺以上時，每三公噸乾簽，可掛置五七%袋裝「好達勝」煙燕劑一袋。煙燕後，門窗須密閉一周，待倉內毒氣消失後，才可啓用甘藷簽。（廖嘉信）

放牧養鵝

問 (一)四月齡鵝每日須餵飼牧草與飼料各若干？

(二)如以栽植盤固草或狼尾草養鵝，每甲地可放牧多少隻鵝？

(三)鵝毛有何用途？（高雄市新興區中東街一三二號許光輝）

答 (一)每隻每日約需牧草一・一〇五公斤，飼料〇・一二一公斤（每甲地盤固草，年產約九萬公斤，可放牧二〇〇～三〇〇隻鵝，但確實隻數全視牧草的茂盛和嫩綠與否而定。放牧時，最好採用輪牧，以保持牧草的清潔，及避免過度放牧，而造成牧草死亡。

狼尾草只適於割飼，每甲地年產約二〇～三五萬公斤。

(三)鵝毛的用途很廣，可用於寢具、僞裝、羽毛纖維、睡眠袋、鵝絨被、墊褥填充物及家具等。有的將鵝宰殺後剝皮，拔去大翅及小翅，留下絨毛及鵝絨，這種鵝皮剝下後加以採製，染成不同顏色，切割成小塊作爲婦女化粧用粉撲。一般白羽毛比有色毛值錢。（唐清芩）



水果增收新步數!!

近來有一些農友們將用在蘭花的美國製高級園藝肥料：

花寶二號

HYPONeX 20-20-20

以「葉面施肥」噴霧在葡萄、蓮霧、檸檬、荔枝、枇杷、木瓜、香瓜等果樹上，結果——糖度增加，收量及品質大大地提高。收入劇增，大家笑嘻嘻！

花寶二號不但可與農藥混合使用，省工有效，並且計算起成本却意外地合算，所以愛用者也日日增加了。

◎尚未用過的農友們！早日試試看！

■樣品、說明書、訂購辦法備索。

製造元 美國 HYPONeX公司

台灣總代理 台和園藝企業股份有限公司

(玫瑰花推廣中心 關係企業)

台北市士林區中正路104巷1弄2號

電話：831-3302・831-3086

郵政劃撥：101360號

美國進口 硫酸錳

• 現貨供應 • 說明書備索

❶ 添加於飼料中 防止家禽家畜腳氣病，提高生殖及生長率。

❷ 供製微量元素 促進植物生長，促進種子發芽率及生長率。

❸ 工業上多種用途。

四光行有限公司

台中市西區福龍街14號

TEL:(042)267227・249587・228955