番茄爲雌雄同化，除溫度在十五度C以下及二〇度C以上時，須使用〇・一五%番茄生長素溶液五〇～一〇〇倍處理化穗外，皆可自交授粉。而溫室栽培能以人工控制溫度在二〇～二五度C，所以無此顧慮。

甜椒爲雌雄同花，能自交授粉。但在一〇～一五度C會引起單爲結果，果實內無種子。而溫度高於三五度C時，有果率很差。在適溫下的溫室不致發生此現象。（王進生）

## 甘藷簽害虫

**問** 我在三月上旬採收台農五十七號甘藷後，立即作成甘藷簽，經過充分乾燥才收藏起來。最近發現有象鼻虫及擬穀盜兩種害虫發生，將甘藷簽啃細成粉末狀。請問應如何防治？（雲林縣水林鄉海埔村八十五號陳水柱）

**答** 甘藷簽害虫的防治方法爲：

1. 新簽入倉前，以五〇%無臭「馬拉松乳劑」四〇倍液噴佈倉內四壁及器具、容器等。

2. 入倉後，發生虫害時，以一%無臭「馬拉松淀孕粉劑」均勻拌和於乾簽中，用藥量爲甘藷簽量的一千五百分之一。以後每隔一個月，以同樣方法處理表層深約一〇公分範圍的甘藷簽。

3. 如爲可密閉的獨立倉庫，且距離住宅、畜舍等在二公尺以上時，每三公噸乾簽，可掛置五七%袋裝「好達勝」煙燕劑一袋。煙燕後，門窗須密閉一周，待倉內毒氣消失後，才可啓用甘藷簽。（廖嘉信）

## 放牧養鵝

**問** (一)四月齡鵝每日須餵飼牧草與飼料各若干？

(二)如以栽植盤固草或狼尾草養鵝，每甲地可放牧多少隻鵝？

(三)鵝毛有何用途？（高雄市新興區中東街一三二號許光輝）

**答** (一)每隻每日約需牧草一・一〇五公斤，飼料〇・一二一公斤（每甲地盤固草，年產約九萬公斤，可放牧二〇〇～三〇〇隻鵝，但確實隻數全視牧草的茂盛和嫩綠與否而定。放牧時，最好採用輪牧，以保持牧草的清潔，及避免過度放牧，而造成牧草死亡。

狼尾草只適於割飼，每甲地年產約二〇～三五萬公斤。

(三)鵝毛的用途很廣，可用於寢具、僞裝、羽毛纖維、睡眠袋、鵝絨被、墊褥填充物及家具等。有的將鵝宰殺後剝皮，拔去大翅及小翅，留下絨毛及鵝絨，這種鵝皮剝下後加以採製，染成不同顏色，切割成小塊作爲婦女化粧用粉撲。一般白羽毛比有色毛值錢。（唐清芩）




水果增收新步數!!

近來有一些農友們將用在蘭花的美國製高級園藝肥料：

花寶二號

HYPONeX 20-20-20

以「葉面施肥」噴霧在葡萄、蓮霧、檸檬、荔枝、枇杷、木瓜、香瓜等果樹上，結果——糖度增加，收量及品質大大地提高。收入劇增，大家笑嘻嘻！

花寶二號不但可與農藥混合使用，省工有效，並且計算起成本却意外地合算，所以愛用者也日日增加了。

◎尚未用過的農友們！早日試試看！

■樣品、說明書、訂購辦法備索。

製造元 美國 HYPONeX公司

台灣總代理 台和園藝企業股份有限公司

(玫瑰花推廣中心 關係企業)

台北市士林區中正路104巷1弄2號

電話：831-3302・831-3086

郵政劃撥：101360號



美國進口 硫酸錳

• 現貨供應 • 說明書備索

❶ 添加於飼料中 防止家禽家畜腳氣病，提高生殖及生長率。

❷ 供製微量元素 促進植物生長，促進種子發芽率及生長率。

❸ 工業上多種用途。

四光行有限公司

台中市西區福龍街14號

TEL:(042)267227・249587・228955