

防治法：(1)切根虫發生嚴重地區，播種時可條施三多加保扶粒劑於種溝，每公頃一次用藥量為三〇公斤。

(2)生育期可用三五%安殺番乳劑一、〇〇〇倍希釋液或二二·五%陶斯松乳劑七〇〇倍希釋液噴射。

(4)大螟虫：水稻種作的玉米易受大螟虫蛀孔為害，使植株枯萎倒伏。

防治法：與玉米螟虫防治法同。

(5)玉米蚜虫：多羣集於為害玉米新葉、雄花穗及莖部。

防治法：發生時，可用九〇%納乃得可濕性粉劑三、〇〇〇倍希釋液，或七五%歐殺松可溶性粉劑一、五〇〇倍希釋液噴射。此二種殺虫劑可同時防治玉米螟虫、玉米穗虫、大螟虫、切根虫及奇蛾等。

(6)毒蛾：幼虫多集中為害果穗、花絲及果穗頂端部位。

防治法：與玉米穗虫防治法相同。

(7)露菌病：病株先於嫩葉基部沿葉脈產生條狀的病斑，漸次明顯而呈黃白色，濕度高時病斑上產生白色綿屑狀物，是本病病原菌的分生孢子梗及分生孢子，幼株發病者可致全株枯死，生育後期的病株，常引起矮化、長穗軸無穗多穗等症狀。

防治法：(1)拔除並燒毀附近患有露菌病的甘蔗病株及拔除玉米病株。(2)發病嚴重地區，應即廢耕並禁止再種玉米或甘蔗的感染品種。(3)種植抗病性玉米品種如台南一一號。(8)煤紋病：本病最特殊的病徵是在葉片上產生大型橢圓形的病斑。並能擴展至葉鞘基部，初呈水浸狀，而逐漸呈褐色，中央部稍帶暗色，其上並着生許多黑絨狀的霉。本病通常於抽穗前後較易發生，嚴重時全葉枯萎、果穗下垂。











台北區農業改良場場長洪汝煌(左)說明甜玉米推廣情形(近)




豐收冬

10%粒劑

驅除害蟲種類：

 福飛蟲	 地下害蟲	 紅蜘蛛	 蚜蟲
 溝蠅	 前馬	 浮塵子	 土壤線蟲



行政院青年輔導委員會輔導創業工廠
華農企業股份有限公司
 屏東縣長治鄉香楊村庄美22號 電話：屏東市(087)324881號