

(3) 栽培抗病性品種如台南一一號。
 (4) 每隔十天用六五%銻乃浦或八〇%錳乃浦可濕性粉劑四〇〇倍希釋液噴射。


(9) 葉枯病：本病主要於葉部，白下部的葉開始發生，先產生褐色的斑，逐漸擴大成不規則淡褐至褐色病斑，周圍常有紫紅的變色，中央部稍褪色而成褐色。本病較易發生於九月至十月間的幼苗。
 防治法：(1) 注意肥料三要素的配合，勿使缺肥。

(2) 用六五銻乃浦或八〇%錳乃浦可濕性粉劑四〇〇倍希釋液噴射，每隔一〇天施藥一次。

(10) 散紋病：罹病的葉上顯出黃綠色的斑點或條斑，生長不良，變化，常不開花，發病劇烈時生長停頓、枯死。
 防治法：(1) 拔除病株並燬毀。

(2) 玉米田附近最好勿栽培易罹病的作物，如高粱、粟等，並清除田間雜草及驅除蚜虫。

(11) 鏽病：病由裡面形成黃褐色斑點，其背面隆起，形成夏孢子堆，漸變成暗褐色，而後夏孢子堆破裂，散出褐色粉末為其夏孢子。
 防治法：(1) 栽培抗病性品種，如台南一一號。(2) 噴射六五%銻乃浦或八〇%錳乃浦四〇〇倍希釋液。




甜玉米真好吃(近)



革命性產品 香菇專用 提高產量品質

久和遮光蓆

中日技術合作遮光蓆(DIOSHEET)ダイオシート



- ① 香菇栽培・其他菇菌初期培養遮蔭，請用#1210，遮光率80%
- ② 香菇平地蔭棚架設#1410遮光率93%
- ③ 每年老化率15%，使用壽命五年以上
- ④ 目錄、架設技術資料備索

價格表	代號	遮光率	規格	坪數	批發價	零售價	備註
	#1210	80~85%	1公尺×50公尺	15坪	880元	1,150元	凡購十捆以上，按批發價計算。
	#1410	90~95%	"	"	1,200元	1,500元	

久和農業股份有限公司
 台中市繼光街141號 TEL.(042) 217837・253929

埔里連絡處：久和農場
 埔里鎮蜈蚣路5之3號