

# 果樹盆栽引人注目

• 李百華

當你吃水果時，常常會有意或無意地把果實中的種子丟棄在地，於無人照顧、無人培養的情形下，常常會長出一棵非常引人注目的新植物，這是為什麼呢？

如桃、李、海棠、酪梨等堅果類及柑桔類的種子，在良好的環境下方可發芽生長。通常將此等種子放入盆栽用培養土中，保持溫暖潮濕狀態，便能發芽。如採用特殊的處理，更有利於此等種子之發芽。例如：生長在寒冷地區之喬木或灌木，其堅硬的種子需要一段高溫與低溫的交換變溫時期，以使打破休眠，此種處理稱為層積變溫處理法。

堅果類及柑桔類的播種栽培很費時間，發芽者，三個月即能發芽；發芽慢者，則需要三個月以上的時間，故必需耐心地靜待。假如水果經過煮熟或醞製，則種子的活力已被殺死，因此用於播

利用層積變溫處理促進發芽的水果種類不勝枚舉，諸如：杏、油桃、荔枝、芒果及櫻桃等有堅硬果殼者，皆用此法處理栽培。另外，小種子之類的水果有檸檬、安石榴、西瓜、番茄等，都可以自己隨意栽培。

海棗(棗椰子)：海棗(*Phoenix dactylifera*)是一種優美的室內觀賞植物，由皮熟的海棗種子發芽出來的。將種子埋入裝有培養土之盆鉢之深處，保持水分濕潤，溫度攝氏二十二度。約二~三個月後


，第一片葉子發生，葉片是肥厚而粗壯。此時必需將盆鉢移置在日照充足處，每年換土一次，幾年後就可以培養出一棵又大又美的棗椰子(Date palm)。

## 酪梨、荔枝、芒果：

此三種植物是最瀟洒也是最受人歡迎的室內植物。種子先以厚紙板或牙籤支撐，然後放在玻璃瓶溫水中。酪梨約三~八星期即可發芽，荔枝、芒果則需八星期以上的時間才能發芽。將此發芽之種子移至光線照射良好的地方，當根羣豐富，生長強健時，把種殼去掉，小心地放置



楊桃盆栽(郭瑞祥)



果樹盆栽 由左而右：荔枝、安石榴、芒果、船梨、柑桔

於六英寸盆的砂質培養土裡，勿傷及根部。

在溫暖多光的環境下，生長迅速，葉片深綠，同時樹幹形成容易。若欲使它叢生矮化，可以去除生長點，使側枝發生，土壤水分隨時保持濕潤，夏天每隔三星期行葉面施肥一次。

**櫻桃、桃、李：**此類植物耐寒力強，且可任意

修剪成扇形或支架形。冬天或春天開花，花色常為白色或粉紅色，花朵美麗，呈叢生狀。氣溫適合時會結果。

種子行層積變溫處理促進發芽。種殼堅硬者，可先行碎破，然後播種，使發芽提早產生，但勿傷及珠心，因這是種子的生命中心。將種子播在四英寸盆中，播種深度以一英寸為宜。

**檸檬、柑桔：**此類植物具有深綠色葉片，樹高

六尺時，會產生芳香性花朵和果實，肯定可以使樹身矮化。此等植物耐寒力差，在寒冷地帶栽植時，冬天需有庇護物，使平均溫度保持在攝氏八至一〇度。夏天則喜歡日照充足、通氣良好、水分濕潤之地。

**安石榴：**安石榴 (*Punica granatum*) 是一種

非常吸引人的庭園植物，具淺綠色葉片，夏天開出二英寸長的深紅色花朵，陽光充足時會產生橘紅色果實，成熟後可食用。果實中滿佈種子，種子播種後很快就發芽且生長迅速。

春大於攝氏二六度播種，發芽後將小苗分別移入四英寸盆，注意澆水，冬天謹防霜害。



由上而下：中國蘭、彩葉草、仙丹（吳崇祥）



鳳凰木盆栽