

「最佳。」

(2)番石榴含有單寧是收斂作用，多食有便秘情形。但習慣後，影響較輕微。(張振宙)



### 金針菜不開花

問

(1)金針菜需多久才會開花？  
(2)金針菜種了二、四年，雖然長得很旺盛，卻大多數不開花，這是什麼原因？

(3)收成後要如何加工？(台東縣關山鎮德高里水豐一號吳家豐)

答 (1)金針菜的根有一種是貯藏根，也稱為營養根呈紡錘狀，專門貯藏養分。金針菜的苗如帶有此種根，很快就會開花，如在秋季(十月)栽植，次年八月可開花。不帶這種根的，需等生出貯藏根後，才能開花，大概在植後第三年才開花。

(2)以台灣現有大多數栽培品種而言，種植的海拔太低，會影響開花，即或開花，花數也少。目前本省生產地區多在海拔七〇〇—一、〇〇〇公尺。

(3)收成後要如何加工？(台東縣關山鎮德高里水豐一號吳家豐)

答 (1)金針菜的根有一種是貯藏根，也稱為營養根呈紡錘狀，專門貯藏養分。金針菜的苗如帶有此種根，很快就會開花，如在秋季(十月)栽植，次年八月可開花。不帶這種根的，需等生出貯藏根後，才能開花，大概在植後第三年才開花。

(2)以台灣現有大多數栽培品種而言，種植的海拔太低，會影響開花，即或開花，花數也少。目前本省生產地區多在海拔七〇〇—一、〇〇〇公尺。

(3)收成後要如何加工？(台東縣關山鎮德高里水豐一號吳家豐)

尺。

(3)製金針乾的方法有三：①自然晒乾：將採下來的花苗，不經任何處理，直接晒乾。產品蓬鬆，保持原色。

②花苗經殺青後晒乾。產品較①法緊實，深褐色。③花苗經殺青，煙蒸晒乾，產品如②法同樣緊實，灰白色。(李玉寶)

水稲倒伏

問 今年種植蓬萊稻一三九號品種，自播秧至今已有一個月半月多，最近因為生長情形過於茂盛，莖葉軟弱，經過這一次艾美颶風來襲，有許多倒伏。請問：

(1)今後應如何管理，才能避免倒伏的情形再發生？  
(2)應肥施用若干？(台南縣仁德鄉田厝村一五號曾乾隆)

答 (1)請施行合理施肥法，施肥必需適時、適量、適法，三要素要合理配合；不可偏重氮肥，莖葉不徒長，稻株才不會軟弱倒伏。

在台南地區，一般情形二期稻作在插秧前施基肥，插秧後十天施第一次追肥，第二次在插秧後十七天。穗肥在幼穗形成期，插秧後四〇—四五天左右，幼穗〇.二—〇.三公分長時施用。施肥量應參酌田地肥瘠及氣候情形而定，一般土壤二期作施肥量為每公頃硫酸銨五〇—六〇公升，過磷酸鈣七〇公升，氯化鉀一〇—一四公升左右。

(2)施肥量為每公頃硫酸銨六〇—一〇〇公升，或加氯化鉀三〇公升。(莊尚路)

## 日本キング化学株式会社 啓事

國豐化學工業股份有限公司  
岱原企業股份有限公司

源源進口日本キング各種農藥產品，現在又進

口キング機械油(マシンオイル)原封品，品質特優，供應全省果農使用。

農友有需要者，請就近向零售店購買，或與本公司連絡。以後將陸續進口

其他キング產品，歡迎農友選用，謝謝惠購。



台灣獨家總代理：

國豐化學工業股份有限公司  
岱原企業股份有限公司

台北市南京東路四段十七號五樓

電話：(〇二)七七一二五八〇

七八・四〇七七・七三二二七六二