

黃椰子清雅秀逸

·路統信

黃椰子的英文名稱是黃蝶椰子 (Yellow butterfly palm)，樹形恰如其名，翩翩風姿，飄逸秀緻，給人視覺上以瀟灑爽適的快感。普遍用於觀賞栽培，廣受人們的喜愛。

翠幹簇生，幹為圓筒形，有顯明環節，作庭園景觀栽培者，高達八公尺，徑約八公分，遠望有如竹叢。羽狀複葉叢生於翠幹頂端，整個複葉呈長橢圓形，長達二公尺。小葉(裂片)線形，先端二裂，長約四〇公分，每一複葉約有小葉四〇~五〇對。纖細柔和，優美雅緻。葉柄修長，基部有葉鞘，包裹莖幹。翠幹多為金黃色，葉柄及葉鞘均呈黃色。羽狀葉翠綠或淡綠，在色調上，整株給人以清談爽快的感覺。

雌雄同株，肉穗花序腋生，有分枝。雌肉穗花序作圓錐狀，花形微小，淡黃綠色。六片花被，外側的三片覆瓦狀，內側的三片則呈鑷合狀，雄蕊較花被為長，花略有芳香。果實為漿果，卵形，直徑

約一公分，成熟時外皮紫紅色，種子倒圓錐形。

黃椰子學名為 *Chrysalidocarpus lutescens*，屬名意為「蛹果」，謂其果實形狀與虫蛹相似，原產非洲之馬達加斯加島。同屬另有兩種，馬島椰子及直立黃椰子，均用於觀賞。

馬島椰子或稱馬達加斯加椰子，學名：*C. madagascariensis*，樹姿外形與黃椰子極為相似，唯羽狀葉上的小葉數目較多且硬，長約六〇公分，先端下垂，肉穗花序分枝多。此種在本省於早年即有，自印度及新加坡引進，今極少見。

直立黃椰子學名 *C. lutescens*，單幹直立生長，高達十公尺，猶如檳榔樹，唯基部肥大，有環狀節紋，羽狀葉長二~三公尺。葉作弓形，叢

狀密生於幹頂，樹形特異美觀，為羽狀葉觀賞椰子類中之珍種，在本省尚無引種。

黃椰子最早是在一八九八年自新加坡引進台灣，至今已近八十年歷史。由於深受人們喜愛，加之生育健壯，繁殖容易，栽培極為普遍。不論作園景布置，或培養盆栽作室內觀賞，無不相宜。

尤以近十餘年來，都市高樓大廈興起，盆栽的黃椰子更成為室內裝飾植物的重要角色，高大建築物的門廳、樓梯間、會議廳、旅社、餐廳等公共場所，以至於家庭小公寓的



黃椰子

美國原裝進口最新型濃縮液體混合肥料

農藥(水稻、果樹、茶樹、蔬菜類……)+培蘭多液
=節省人工、增加產量、提高品質。

北市建三肥字第065號
農林廳肥料登記證 農肥字第0134號

您的理想就是我們的目標……

培蘭多液 為農友及園藝栽培愛好者
提供更完美的服務!!

原製造廠：美國培蘭多化學公司 榮譽出品
總代理：旭浩企業股份有限公司
總公司：台北市民生東路990巷百樂大廈B座205室 電話：(02)761-7221
苗栗連絡處：苗栗鎮中江路834號 電話：(037)321203 ※說明書備索



培蘭多液

LIQUID | PLANT
FOOD
10-10-10

陽台及居室處處可見。

作為景觀栽植的黃椰子，根株分蘖繁盛，如不打算利用作為分株繁殖，可運行切取，作為插花材料。鮮花店亦用於花籃製作。

繁殖方法：黃椰子的繁殖，一般都採用分株法，種苗商的专业苗圃大量繁殖時，亦用播種法。如欲育成小型盆栽樹於案頭觀賞，亦以實生苗株較佳。

分株時期以初夏梅雨季節前後為最適當，於根株分蘖發出四、五葉，帶有二、三根時，以利刀切離母株，即為一新苗。植入鉢內，置於遮蔭處，在半月內每日澆水，保持濕潤。見有新根生出，活着即無問題。俟完全發育後予以施肥，翌年春季即可移出栽植。分株時，先檢視分蘖處，如未發根，切勿切取。

黃椰子分蘖旺盛，常致根盤交錯，如係盆栽者，宜將植株連土倒出，打落外部盆土，仔細觀察分蘖根之着生情形，然後在適當位置切取。母株也可就此順便作一次換土栽植，更新生機。

黃椰子母株到了結實年齡，結實量豐富，成熟的種實常掉落四周。檢取或採得樹上完熟果實，去除肉質果皮即得種子，種子的外皮尚包被以棕毛狀纖維，透水困難。

實施播種最好先行浸水，將種子浸入水中，去除潔淨之粒粒及受損傷之種子，經此水選後，沉入水中之充實種子，再經浸水二晝夜，取出播種，則發芽率高，出芽整齊。發芽適溫在攝氏二五~三〇度之間，在椰子植物中屬於發芽需要高溫的一類。

栽培管理：培養土以肥土、燒土、河砂及腐植質等配合調製。燒土是普通田土在攝氏八五度高溫下消毒而成；肥土是以燒土、油粕及魚肥骨粉及過磷酸石灰腐植質混合，加水使完全發酵後使用；河砂以花崗岩崩壞者為最佳；腐植質係由落葉性潤葉樹之落葉腐朽而成，去除小枝及夾雜物使用。

四種原料之配合比例，視樹齡而異。肥土之用量隨苗木之長大而遞增，其他三種則減少。各用量之百分比如下：


幼 苗	肥 土	燒 土	河 砂	腐 植 質
二~三年生苗	5 ~ 10	30 ~ 40	30 ~ 40	30 ~ 40
三年生以後	10 ~ 20	20 ~ 30	20 ~ 30	20 ~ 30
	20 ~ 30	20 ~ 30	30	10 ~ 30
	20 ~ 30	20 ~ 30	30	10 ~ 30

黃椰子之生育期間長，施用肥料以遲效性的有機質肥料較為理想。盆栽一般用油粕，庭園栽培者除油粕外，另加魚肥及雞糞即可。盆栽的黃椰子，如能依上述配製培養土，其所含養分已相當豐富，在幼苗時期自可不必施肥。

盆栽黃椰子於盆底透水孔，見有根伸出時，或因根之生長，植株升高，根基部高出盆之邊緣，灌水施肥均不方便，觀賞品級降低，宜適時換盆。於換盆時勿傷及根部。

椰子類為觀葉植物，須有優美的葉形與葉色，故盆栽黃椰子於炎夏應避免強烈日光照射，以免葉部發生「日燒」而失去觀賞價值。並須經常澆水保持盆土濕潤，勿使過分乾燥。

黃椰子生育強健，很少病蟲害發生。盆栽用於室內觀賞者，長時間置於光線較弱處所，莖葉徒長變得纖弱，每隔一段時期，移出室外使接受雨露滋潤，恢復正常發育，再移室內陳設。如能多培養幾盆，室內室外輪換放置，自然是最理想的了。



——黃椰子果實(右)及種子(左)——

最新發售 美國製

神通7E 超 級 油

(SUNSPRAY 7E SUPERIOR CROP OIL)

美國太陽油品公司 榮譽出品
Sun Oil Company U.S.A.



德城行有限公司 總代理
MORALBURG TRADING CORPORATION
台北市仁愛路二段72-9號2-1樓
電話：(02)3912062, 3935360

減少農藥用量，節省農業成本，增加防治效果。

德城行提供農業上最新的防治技術。

- 一、蘋果、梨、桃、柑桔、葡萄、水稻等重要病蟲害，只要將神通油400倍加入殺菌劑(免賴得、大生類、大富丹)或殺蟲劑(馬拉松)等原用藥量之半，充分攪拌就有比原來用藥量更佳明顯之效果，四季可使用。
- 二、冬季用神通油100~200倍與殺蟲劑(馬拉松)混合使用，可防治果樹紅蜘蛛、介殼蟲、刺粉蟲及銹蟎蟲等害蟲。

說明書函索即寄