

陽台及居室處處可見。

作為景觀栽植的黃椰子，根株分蘖繁盛，如不打算利用作為分株繁殖，可運行切取，作為插花材料。鮮花店亦用於花籃製作。

繁殖方法：黃椰子的繁殖，一般都採用分株法，種苗商的专业苗圃大量繁殖時，亦用播種法。如欲育成小型盆栽樹於案頭觀賞，亦以實生苗株較佳。

分株時期以初夏梅雨季節前後為最適，於根株分蘖發出四、五葉，帶有二、三根時，以利刀切離母株，即為一新苗。植入鉢內，置於遮蔭處，在半月內每日澆水，保持濕潤。見有新根生出，活着即無問題。俟完全發育後予以施肥，翌年春季即可移出栽植。分株時，先檢視分蘖處，如未發根，切勿切取。

黃椰子分蘖旺盛，常致根盤交錯，如係盆栽者，宜將植株連土倒出，打落外部盆土，仔細觀察分蘖根之着生情形，然後在適當位置切取。母株也可就此順便作一次換土栽植，更新生機。

黃椰子母株到了結實年齡，結實量豐富，成熟的種實常掉落四周。檢取或採得樹上完熟果實，去除肉質果皮即得種子，種子的外皮尚包被以棕毛狀纖維，透水困難。

實施播種最好先行浸水，將種子浸入水中，去除潔淨之粒粒及受損傷之種子，經此水選後，沉入水中之充實種子，再經浸水二晝夜，取出播種，則發芽率高，出芽整齊。發芽適溫在攝氏二五~三〇度之間，在椰子植物中屬於發芽需要高溫的一類。

栽培管理：培養土以肥土、燒土、河砂及腐植質等配合調製。燒土是普通田土在攝氏八五度高溫下消毒而成；肥土是以燒土、油粕及魚肥骨粉及過磷酸石灰腐植質混合，加水使完全發酵後使用；河砂以花崗岩崩壞者為最佳；腐植質係由落葉性潤葉樹之落葉腐朽而成，去除小枝及夾雜物使用。

四種原料之配合比例，視樹齡而異。肥土之用量隨苗木之長大而遞增，其他三種則減少。各用量之百分比如下：


幼 苗	肥 土				燒 土				河 砂				腐 植 質			
	2~3年生苗	10~20	20~30	20~30	10~30	20~30	20~30	10~30	20~30	20~30	20~30	20~30	20~30	20~30	20~30	
三年生以後	20~30	20~30	20~30	10~30	20~30	20~30	20~30	10~30	20~30	20~30	20~30	20~30	20~30	20~30	20~30	

黃椰子之生育期間長，施用肥料以遲效性的有機質肥料較為理想。盆栽一般用油粕，庭園栽培者除油粕外，另加魚肥及雞糞即可。盆栽的黃椰子，如能依上述配製培養土，其所含養分已相當豐富，在幼苗時期自可不必施肥。

盆栽黃椰子於盆底透水孔，見有根伸出時，或因根之生長，植株升高，根基部高出盆之邊緣，灌水施肥均不方便，觀賞品級降低，宜適時換盆。於換盆時勿傷及根部。

椰子類為觀葉植物，須有優美的葉形與葉色，故盆栽黃椰子於炎夏應避免強烈日光照射，以免葉部發生「日燒」而失去觀賞價值。並須經常澆水保持盆土濕潤，勿使過分乾燥。

黃椰子生育強健，很少病蟲害發生。盆栽用於室內觀賞者，長時間置於光線較弱處所，莖葉徒長變得纖弱，每隔一段時期，移出室外使接受雨露滋潤，恢復正常發育，再移室內陳設。如能多培養幾盆，室內室外輪換放置，自然是最理想的了。



——黃椰子果實(右)及種子(左)——

最新發售 美國製

神通7E 超 級 油

(SUNSPRAY 7E SUPERIOR CROP OIL)

美國太陽油品公司 榮譽出品
Sun Oil Company U.S.A.



德城行有限公司 總代理
MORALBURG TRADING CORPORATION
台北市仁愛路二段72-9號2-1樓
電話：(02)3912062, 3935360

減少農藥用量，節省農業成本，增加防治效果。德城行提供農業上最新的防治技術。

一、蘋果、梨、桃、柑桔、葡萄、水稻等重要病蟲害，只要將神通油400倍加入殺菌劑(免賴得、大生類、大富丹)或殺蟲劑(馬拉松)等原用藥量之半，充分攪拌就有比原來用藥量更佳明顯之效果，四季可使用。

二、冬季用神通油100~200倍與殺蟲劑(馬拉松)混合使用，可防治果樹紅蜘蛛、介殼蟲、刺粉蟲及銹蜂蟲等害蟲。

說明書函索即寄