

# 土番鴨飼養 (四)

康清亮

(續上期)

## 疾病防治

不良的衛生管理，是引起疾病最大的原因之一。採取下面措施，不會增加很多費用，而能確保鴨羣的安全。

- (1) 鴨舍四週保持排水良好，鴨糞及墊料處理乾淨。
- (2) 進鴨前，清潔消毒鴨床。
- (3) 鴨舍通風良好，墊料或鴨床保持乾燥，不要過度密飼。
- (4) 每個養鴨場，應建造死鴨坑一個或兩個。
- (5) 注意觀察鴨羣吃料情形，如有死鴨，立即移開燒毀或投入死鴨坑。
- (6) 防止麻雀、老鼠、貓或狗等進入鴨舍。
- (7) 餵料後，飼料槽及地板立即清洗乾淨。下雜魚易招引蒼蠅，應存放在冷藏庫或以其他方法隔絕蒼蠅蚊蟲。
- (8) 飼料混合機使用後應清洗，以免蒼蠅停留。
- (9) 收集鴨糞，投入發酵池發酵。用過的墊料須口鴨舍移開，製造堆肥。
- (10) 進行預防注射。

常見的疾病及防治方法如下：

**病毒性肝炎一般症狀：**二周齡小鴨發生最多。發病之初呈離羣、動作遲鈍、閉眼蹲下、採食但不飲水、腹肌弛緩、羽毛無光澤等現象。病狀惡化時，有步行困難、橫臥、沈鬱、振

肢向後、狀若悶，表示將死亡。

通常於病發後三、四小時即死亡，亦多有不見症狀而死亡者。如伴有嘔吐或呼吸氣病者，死亡率為五、八五%，平均為二、八%。

**解剖症狀：**主要病變在肝臟腫大，呈微紅色，有時呈黃褐色，白膜下有多數小出血點，或出血斑，或充出血的紋理。腎臟有時呈充血或小出血點並輕度腫大。脾臟亦稍腫大。腦膜充血或出血。


**防治：**應儘量避免人畜出入鴨舍，妥為處理飼料、飲水及病鴨排泄物。病鴨不可隨意丟棄，應放入死鴨坑。預防本病，應自無病源的孵化場購買小鴨，注意飲水清潔，小鴨購進時注射免疫血清。發病初期用〇·五CC免疫血清注射有效。

**家禽霍亂一般症狀：**病鴨極度口渴，食慾消失，虛脫，神經性痙攣或頻頻搖頭，體溫升高，頸胸發熱。最初排黃色粘稠排泄物，接著排微綠色及水狀排泄物，肛門四週的羽毛均粘染稀薄糞便。兩眼有粘稠分泌物，鼻孔有粘穢物堵塞，肌肉充血，皮膚呈粉紅色，趾及關節腫脹。

本病發生多為急性，死亡率高達九〇%，慢性者可生存數周，四周齡以內死亡率極高，老齡者在五〇%以下。  
**解剖症狀：**心臟擴大，肝臟腫大，上面有白斑或針狀出血點。與腎充

頭、橫轉等神經症狀。如見反臥、頭頸後仰、兩

汽油、柴油 二衝程·四衝程  
一馬力至二十馬力各馬力齊全



EY18-3B

兼售ROBIN汽油引擎發電機  
RG10C·RG17D·RG25D·RG33D·RG50



樂敏牌

ロビン  
エンジン

農業、産業機械之動力源

●強力●輕便●省油●耐用

製造元：富士重工業株式会社

經銷處：樂敏有限公司

台北市康定路18號4樓

TEL.3610740·3612045·3613541~3