

血，常有膠質排泄物。腸道呈出血現象，內容物呈半流體狀，腸道血管充血。脾腎腫脹。肌肉呈黑色。

防治：木病可由人畜、鳥類、蒼蠅、老鼠、貓、狗等帶菌傳染，因此必須管制人畜進出鴨舍。病鴨立即投入死鴨坑或焚埋。

鴨羣應施行疫苗注射。產蛋鴨每四個月注射一次。緊急防治時使用一〇〇〇C疫苗加鏈黴素二公克，充分混合後注射，同時再注射治療量的鏈黴素有效。

副傷寒一般症狀：產蛋率降低二五%以上。病原菌寄生在盲腸，病鴨垂頭垂翼，羽毛鬆亂，口渴，呼吸困難，糞粘肛門，消瘦沒有精神，羣聚一隅。

解剖症狀：十二指腸、肝、腎、脾充血及出血點，心內外膜炎，心臟液增多，有纖維性滲出物。

防治：磺胺類藥劑、氣黴素、鏈黴素等口服有效。

家禽傷寒一般症狀：初期排黃綠色下痢便，食慾廢絕，發高燒。

解剖症狀：肝、脾、腎腫大充血，肝呈棕綠色或青銅色，並有灰白色病灶。心臟炎，腹膜炎，卵巢出血變色，腸卡他性炎。

防治：可用免疫血清緊急治療。氣黴素、磺胺劑口服或注射均有效。

感冒一般症狀：食慾減退，流鼻涕，產蛋率降低，呼吸有聲。

防治：改善鴨舍環境，更換墊料，口服磺胺劑或抗生素。

鴨球虫病一般症狀：食慾減退，體重減輕，羽毛無光澤，背腰彎曲，下痢，嚴重者有深紅血便。

解剖症狀：腸管出血，盲腸出血

最為嚴重。腸內有乳酪樣物。正番鴨十周齡以下容易得此病。

防治：口服磺胺劑或抗生素。

軟脚病由於水浴溫度過低、墊料過濕、飼料不平衡、傳染病、感冒、下痢、球虫病、營養不良等所引起。治療可用複合維他命、抗生素、磺胺劑等。注意改善鴨舍通風，保持墊料乾燥。

中毒由農藥、發霉飼料、不新鮮魚鱗、尿內、屍蛆等引起。

中暑夏天鴨舍通風不良，颯熱風，烈日直晒等引起。可把鴨羣移至陰涼處，充分供水，飲水中加複合維他命以加速復原。

表三：土番鴨飼料配方舉例

第一階段（一—三日齡）

白米飯：四六%，糙米飯：四六%

魚粉：八%，合計：一〇〇%

第二階段（四—一六日齡）

玉米：六〇%，豆餅：三〇%，魚粉：四%，酵母粉：二·五%，下

維魚：〇·五%，骨粉：二·五%，鹽：〇·五%，合計：一〇〇%，粗

蛋白質含量：二〇·二%

第三階段（一七—三五日齡）

玉米：五〇%，豆餅：一九%，大麥：二〇%，魚粉：三%，下維魚

：五%，骨粉：二·五%，鹽：〇·五%，合計：一〇〇%，粗蛋白質含

量：一七·一%，另外加等容量的粗

糠，混合飼餵。

第四階段（三六—七〇日齡）

玉米：五五%，豆餅：一四%，大麥：一五%，下維魚：八%，秧皮

：五%，骨粉：二·五%，鹽：〇·五%，合計：一〇〇%，粗蛋白質含

量：一六·三%，另外加等容量的粗

糠，混合飼餵。

以上配方，可依價格及營養狀況酌予調整。

（全文完）

有獎

電視農業節目 觀眾意見調查

參加辦法及調查問卷在本刊67年新年特大號發表，敬請密切注意！

訂閱豐年半月刊 全年24期150元 郵政劃撥5930豐年社