生蘭如萬代蘭、蝴蝶蘭等的根喜暴露在空氣中，所以萬代蘭宜種在木條盆中，根從木條縫隙中下垂盆外。而蝴蝶蘭要種在蛇木板上，讓根附着板面生長。這樣根才不會腐爛。

㈠蘭葉葉上的害虫，可噴佈「蘭美丹」一、〇〇〇倍稀釋液防治。

㈡根莖上的白色粉末是粉介殼虫。防治法如㈠。噴佈藥劑時，須使莖葉及盆中栽培材料全部噴濕。（蔡致謨）

冬瓜壓蔓

問 ㈠冬瓜母蔓經過壓蔓處理後，子蔓發育旺盛。子蔓應留幾條較經濟？又子蔓壓蔓處理宜在第幾蔓實行？孫蔓應摘除否？

㈡水解蛋白質噴洒的濃度如何？

㈢冬瓜定植時，每穴施約一斤雞糞及少許三要素，結果大部份植株瘦小、黃葉，甚至枯死。請問是何原因？（屏東縣高樹鄉菜寮村太平路四三號許秀福）

答 ㈠子蔓應適宜誘引，一般留四～五枝，宜在六～八節實施壓蔓。如孫蔓過多，瓜蔓過於茂盛，須適宜摘除，以利陽光照射提高株體內的碳含量，充實植株，才能順利開花着果。經過壓蔓的冬瓜植株如遇到寒流較耐寒，霜害輕。

㈡水解性蛋白質是一種營養劑，不可單獨使用，須摻入殺虫劑如二五％「馬拉松」可濕性粉劑，作爲瓜實蠅的誘殺劑。

㈢一般雞糞均摻有木屑或谷殼，如未先經過堆積醱酵，雞糞中之木屑或谷殼尚未爲纖維分解菌分解，而纖維分解菌須仰賴氮素爲營養而繁殖，因此在分解木屑、谷殼時，纖維分解菌不但利用雞糞本身的氮素，不够時尚向土壤中奪取利用，使土壤一時呈缺少氮素。而導致冬瓜苗株營養不良，葉葉變黃。

又雞糞在酸鹼中也會傷及根部，使瓜株枯黃。所以雞糞必須經過腐熟才能作爲穴施式的基肥。（王進生）

花韭生長不齊

問 年花韭菜生長不齊，是否可將地上部割一次，使生長齊一？割葉後，對抽苔和收量有無影响？（陽明山格致路一一三巷三號楊惠君）

答 年花韭菜以收穫花苔爲目的，割葉將影响抽苔時期延遲，韭苔量減少，所以不宜割葉。生長不齊，應注意施肥。（郁宗雄）

花、菜、果農友們的好消息

最佳的園藝肥料系列——

任您《選擇》《配合》使用

園藝專家最愛用	速效水溶性・微量元素完全配合 花寶 HYPONeX	美國歐老號流行數十年五種配方
日本國內業者最廣用	緩效持續性粒肥・半年有效 愛美(IB) 園藝肥 10-10-10	三菱公司世界專利新法製造
造林・綠化最佳新武器	肥效持續三至五年・效果絕對保證 愛美(IB) 林木肥 23-2-0	三菱公司世界專利新法製造
海魚配製開花專用	促進花芽分化・效果宏大風評佳 ALASKA 0-10-10 魚精開花肥	美國製精心配成
鮮魚精製純粹有機質	特適幼苗成長・肥性溫和可靠 魚精生長肥 5-2-2	美國製特適蘭花等高級植物
高磷酸配合最佳基肥	一至二年長效持續・清潔安全 魔肥 MagAmp-K	美國製精適高級蘭花高級草花
價格低廉的	水溶性肥料 五種配方 Peters® 百得肥	美國進口大量供應

■全省各地蘭園、園藝店、花店、種苗店均有出售。

■經銷店如缺貨供應，請直接來信洽詢。

台灣總代理 台和園藝企業股份有限公司

台北市士林區中正路104巷1弄2號

電　　話：831-3302・831-3086

郵政劃撥：101360號

花、菜、果農友們的好消息!!

五種 花寶® HYPONeX® 擴大供應！

《最優秀的葉面用肥料》

花寶一號 (7-6-19)	適合全般植物根莖強壯及特適蔬菜育苗用。
花寶二號 (20-20-20)	適合全般植物快速成長及果實增加糖度及產量用。
花寶三號 (10-30-20)	促進花芽分化、花朵鮮麗，果樹之着果率提高適用。
花寶四號 (25-5-20)	促進球莖、球根及全般植物之莖、莖、根強壯用(尤適業者使用)。
花寶五號 (30-10-10)	蘭花幼苗及一般幼苗快速成長用。

■全省各地園藝店、種苗店、農藥店、蘭園、花店均有出售。

■樣品、說明書、訂購辦法備索。

台灣總代理 台和園藝企業股份有限公司

台北市士林區中正路104巷1弄2號

電　　話：831-3302・831-3086

郵政劃撥：101360號