

產菇前適當灌水

1. 菌種由下種至菌絲蔓延整個菌床止，約需三五(四)天(依菇舍的厚薄而異)，即可長出子實體(菇蕾)，此時絕不可灌水，只要覆土保持適當的水分即可。

2. 等到菇蕾長成一角銀幣大小時，才可開始大量灌水(俗稱開水)，同時亦要大量的通風換氣。開水應視氣溫是否適合，開水的日子一到，若當時氣溫還太高則可遲延，等氣溫降低時才開始灌水。溫度太高時若開水，菇蕾會因高溫受傷而枯死。

3. 大量灌水的目的，在使覆土土壤飽和含水量由四〇%升高至七〇%。(以紅外線水分測定器，測得讀數應在三〇%左右)。本省目前所取用的覆土土壤含水量偏低，應分次灌水，在二至三天的時間內，慢慢噴灑使覆土緩慢的吸收，至飽和含水量約七〇%為止，以免一次大量灌水時，過量的水分流入菌床中。

4. 酒水後，若含水量在飽和量的七〇%，最簡單方便的檢驗法是，用手握緊覆土土壤可成泥塊，輕輕敲擊會立刻瓦解，必要時可用紅外線水分測定器測定。

5. 酒水宜用噴霧頭小心操作，噴水方向應與菇床平行，不可指向覆土直接噴酒，以免損傷菇蕾及

覆土物理性質。

6. 發菇前室溫應漸低至一四(一)五度C，床溫在一六(一)七度C，室內相對濕度八五%加減五%，直至採收管理期終了為止。

病虫害預防處理

1. 堆肥場地消毒

(1) 堆肥材料堆積前一週，每坪地面用五〇倍五氯酚鈉(PCP-Na)液一公升噴射泥地，並加酒五倍福爾馬林液一公升。

(2) 堆積前三日，每坪地面用二、〇〇〇倍巴拉松液五〇〇CC噴酒。

(3) 堆積時，場地若為水泥地，則用水把地上農藥沖洗掉，若為土地則用水沖淡。

(4) 菇舍床架、牆壁及菇舍內床架、牆壁、四周地面每坪噴射二〇〇CC的五〇倍五氯酚鈉(PCP-Na)液(床架噴射正反面)。

(5) 堆肥上床前七日，床架以清水噴洗由上層至下層，然後即在菇舍內地面通路酒福爾馬林原液，每棟五〇坪菇舍五公升(可加水泡用)。

(6) 堆肥上床前三日，菇舍外牆壁與四周地面，每坪用五〇〇CC的二、〇〇〇倍巴拉松液噴酒。

(7) 室內床架後發醇溫度下降至四〇度C前，菇

舍內通路地面噴酒五〇〇倍二氯松(DVP)液。

(8) 栽培中期出菇前後，每隔一個月，菇舍門窗、紗網由內向外噴射每坪三〇〇CC的一、〇〇〇倍大利農液。

3. 菌床消毒

(1) 覆土七天前，菌床表面撒佈一%馬拉松粉劑，每坪二〇公克。

(2) 覆土前後一(二)日內以二、〇〇〇倍萬力液噴射，每坪五〇〇CC於菌床與覆土表面。

(3) 覆土後，表面補水計二次，在最後一次用二、〇〇〇倍除虫菊精液噴射每坪一公升，以後每隔七(十)天噴一次。本劑可與漂白粉混用(如果無除虫菊精可用馬拉松乳劑代替)。



(4) 第一次產菇週期後，以一五〇PPM漂白粉噴水噴射，以後每隔七(十)天噴射一次，本劑可與除虫菊精混用。

(5) 栽培末期，每坪菇床以五〇〇CC的二、〇〇〇倍萬力液噴射，若褐斑病發生，以霉敵或萬力二、〇〇〇倍液隔日噴射，計二次。

栽培洋菇是一門技術性的學問，栽培期間的管理步驟皆極重要，不可馬虎，每一種因素皆能大大的影响洋菇的品質與產量，因此希望菇農們能確實注意，小心管理。

克 锈

锈病(紅菇)特效藥



敵 蟎

專殺紅蜘蛛

美國



藥廠出品



發順農藥

台灣總代理：

發順企業股份有限公司

台北市杭州南路一段25號3樓

電話：(02) 3912985 • 3912986