




台灣的荔枝是由福建及廣東二省引進，廣東及福建的荔枝品種各有數十種，合計當在百種以上。

本省引進的荔枝品種共有二十多種，南部種類較中北部為多，計有高雄早生、桂味、糯米糍、玉荷包、糖薄、新興、淮枝、桂枝、赤葉、黑葉、尚書懷等，但栽培較多者不外數種而已。少數品種雖具有經濟價值，但為數尚少，必需加速繁殖推廣，三月紅荔枝就是其中之一。

三月紅荔枝，顧名思義，就是在三月成熟。這裡所說的三月，是指農曆，可以說為所有荔枝最早成熟的。此品種原產廣東，本省新竹縣寶山鄉江農友於光復後到海南島探親，帶回來五株，種活三株。數年前由中興大學黃弼臣教授發現並命名為三月紅，現在已逐漸繁殖推廣中。

三月紅荔枝在南部，從國曆四月


中下旬開始成熟，農曆正好是三月中小雨之間，此時黑葉品種僅花生粒大小而已，而三月紅荔枝已可收成上市了。玉荷包荔枝則已大如五毛錢的大小，其成熟期在五月中下旬，僅次於三月紅。

植株發育緩慢

三月紅荔枝植株發育非常緩慢，嫁接在其他品種荔枝樹上，發育亦同樣的並不茂盛，並且常常有發育經過一個時期或經過一年之後，發育枝即又枯乾，而再由下面嫁接部份處重新抽出新梢，因為如此的不長進，植株令人覺得不往上抽長。


選用砧木，中部最好用狀元紅或萬年紅品種。南部以用高雄早生、赤葉或糯米糍等品種為宜，避免用黑葉品種。

果實橫切面



臍

種子



種子橫切面



嫁接之後抽出新梢，因為有不往上生長的現象，所以應當利用砧木上發出的新枝，用靠接法靠接於砧木上以增強生長勢，以利伸長與發育。

用高壓法繁殖的苗定植之後，因為苗木生長緩慢，所以亦需用其他品種二、三株同時種植在一處，而後又將此其他品種的主枝，亦靠接於三月紅荔枝上，並注意抑制其他品種的生長勢，如除淨新生的枝條，目的在供給三月紅的生長勢，幫助其生長。

種子先端收縮

三月紅荔枝的果實，平均果重二五・七公克，肉重一六・八公克，種子重三・八公克，肉種二・八一公克，糖度一三・五三 Brix，果實品質中等。

種子頗大，但亦有部份（約占三分之一）是小核的，大粒種子先端約三分之一稍為收縮，這是三月紅與其他品種不同的特徵。

肉渣稍多，亦為本品種的缺點，同時臍眼很大，臍部亦大，而形成多肉渣的出現。

三月紅荔枝的葉色較濃綠，花梗亦較短，穗枝色赤褐，果實色澤若無套袋，色呈暗紅，過於猪肝色，反不如用套袋的果實色澤較為鮮紅可愛。

三月紅荔枝的着果率，在結實初期頗多，但因為部份花授粉不完全，

▲三月紅、玉荷包、黑葉荔枝品種成熟期比較。

形成落果亦多的現象，所以栽培者要注意昆虫助媒的工作。

荔枝屬於亞熱帶的果樹，氣溫過高或過冷涼地區，均不適於生產。我國土地雖廣大，可以生產荔枝的省份卻不過三、五省的一部分而已。在非生產地而華僑分佈又多的地方，所有荔枝全靠輸入。

以菲律賓而言，每斤荔枝為非幣四十元，折合新台幣二百元，為高價值果品。但是荔枝鮮果不耐貯藏，運輸技術有待改進。

本省南部氣溫較中北部為高，因此水果的成熟期亦均較中北部早。果實上市愈早市價愈高，就荔枝黑葉品種而言，南部較早收成的，果價常較

中部高出一倍，而三月紅荔枝，更可一枝獨秀，稱霸市場了。

適合南部栽培

除此而外，還希望延長果實供應期間，因此為配合今後發展，南部要發展早熟品種，北部發展晚熟品種，所以三月紅荔枝為適合南部栽培的品種。

但是南部栽培亦有一缺點，那就是如果冬季氣溫溫和，持續時間又長，則會引起荔枝不休眠而再抽出新葉，如此一來就會形成不開花結果的現象，那就要注意栽培管理技術了。

花、菜、果農友們的好消息 最佳的園藝肥料系列—— 任您《選擇》《配合》使用

園藝專家最愛用	速效水溶性・微元素完全配合	美國最老牌 風行數十年 五種配方
日本國內業者最廣用	花寶 HYPONeX	三寶公司製造
造林・綠化最佳新武器	愛美 (IB) 10-10-10	三寶公司製造
海魚配製開花專用	愛美 (IB) 23-2-0	三寶公司製造
鮮魚精製純粹有機質	魚精開花肥	美國製造精心配成
高磷酸配合最佳基肥	魚精生長肥 5-2-2	美國製造精心配成
價格低廉的	魔肥 MagAmp-K	美國進口大量供應
	Peters® 百得肥	

■全省各地蘭園、園藝店、花店、種苗店均有出售。
■經銷店如缺貨供應，請直接來信洽詢。

台灣總代理 台和園藝企業股份有限公司
台北市士林區中正路104巷1弄2號
電話：831-3302・831-3086
郵政劃撥：101360號