


# 農業信箱



## 荸薺腐爛

(一) 荸薺為什麼會爛？  
 (二) 栽培時應注意那些事項，才能使球莖長得大且質白？(彰化縣永靖鄉五汙村六號朱耀宗)

(一) 荸薺是澱粉質蔬菜，不乾不濕時，澱粉很容易醱酵而腐爛。如在完全乾燥狀態下，或放置在水內和泥漿中就不會腐爛了。

(二) 栽培時應注意下列各點：

(1) 種植時期不可太遲，太遲球莖無法增大。本省南部在國曆七月底定植最理想。

(2) 多施磷、鉀肥。氮肥不能施用太多。否則會徒長莖葉，使球莖變小，產量減少。最適宜配合比例為氮：磷：鉀=三：一：二。

(3) 在生育期中，灌水不能中斷，要長期保持土壤濕潤狀態，使根羣充

分發育伸展。

又在發育期中，如碰到颱風災害，球莖就無法增大了。(李伯年)

## 珠雞雌雄鑑定

珠雞如何鑑定雌雄？(台中縣東勢鎮豐勢路中盛巷一〇號郭顯明)


(一) 剛孵出珠雞雌性別鑑定的可靠方法，是用雌雄鑑別器鑑定。也可請蛋用種雞場鑑別師鑑定。

(二) 二月齡以後就可由外表辨認出雌雄。一般公珠雞較母珠雞體格大，身軀長，頭部也大，頸部與胸腔均較長，而且最明顯之處是公珠雞肉髀(下頸兩片肉垂)較大片且長。(唐清岑)

## 木瓜人工授粉


(一) 木瓜如何施行人工授粉？  
 (二) 人工授粉後套袋，何時可打開？

(一) 「台農雜交二號」紅肉品種與「台農雜交三號」黃肉品種間可再互相雜交授粉？將來結的果實果肉是何色？(台中縣霧峰鄉峰谷村峰谷路一一八號彭舜華)



# 羅門哈斯 可利生<sup>®</sup> 可濕性粉劑

可利生經政府正式認定使用於下列作物白粉病(白菇)之防治  
 胡瓜、西瓜、香瓜、苦瓜類、檸檬、蘋果、菸草、棉花



台灣總代理  
 亞洲羅門哈斯公司台灣分公司  
 台北市中山北路二段96號11樓1105室  
 TEL: 5215525-8

## 專門防治 梨、蘋果黑星病 及桃縮葉病

在系統性殺菌劑普遍發生抗藥性的情形下，轉換噴射「新靈」殺菌劑，會有意想不到的優良效果。

# 新

# 靈

# 65

## 殺菌劑

〔說明書函索即寄〕

瑞典確實可佳化學廠 榮譽出品



德城行有限公司 總代理  
台北市仁愛路二段72-9號2樓~1  
電話：(02) 3912062·3935360

●木瓜人工授粉是先摘除快開而尚未開，且花粉已成熟的兩性花蕾。再將雌株上快開而尚未開雌蕊的花瓣剝開，用毛筆沾或用錫子夾兩性花的花粉塊，輕輕且均勻塗在雌花柱頭上。

○授粉後用臘光紙袋套上並綁線，以後不必打開，因果實長大時，可自行擠破臘光紙袋。

○「台農雜交二、三號」均為第一代雜交種，不能再採種，否則後代會分離，果型不整，果肉顏色不一，有黃肉也有紅肉，品質不穩定。(王德男)

## 檸檬樹附生地衣

●檸檬枝幹上常有地衣附着，影響生長。請問應如何防治？(屏東縣新理鄉建巧村建巧路九六號張鏡湖)

●地衣易發生於通風不良，濕度較高的柑園，防治法為：

○整理園內防風林，改良通風。  
○加以適當修剪，改善日照及通

風。  
○地衣發生初期，可噴PCP(克龍)○。三多液清除之。  
○地衣為害較嚴重時，先用刷子刷去地衣再噴藥。(翁仁稼)

## 松樹採種

●松樹可否以實生法繁殖？種子何時採收？何時播種？  
○松樹的種子採收期及播種方法又如何？(苗栗縣苗栗鎮中正路六一號賴雲添)

○可以，但一般多用打種法繁殖。松樹種子是在秋季採收，秋播春播均可。播種時苗床須選用排水良好的砂質壤土，保持土壤濕潤，以利發芽。

○秋季為松果的採收期。松果採收後，需日晒七日，鱗片裂開，把動使松子全出果外，再篩去雜物，就可得種子。  
○播種採用春播，苗床以砂質土壤為佳。播種後覆以鬆土，注意灌水，

## 梅不結果

●我種在菜園中的梅樹常常只開花不結果。偶而結果，也在未成熟之時，全部落光，請問是何原因？(台中縣石岡鄉萬興村豐勢路八〇七巷一號陳徐鎮)

●梅屬落葉果樹，雖能在溫暖地區生長，冬季仍需相當「寒冷溫度」才能正常開花結果。而且開花期間尤宜日夜溫度變化不大的條件配合，才不會引起落花落果。所以貴處種梅如非樹齡太小或品種問題，主要為氣候欠適宜的影響了。(李信芳)

## 雞舍防寒

●土雞受寒，流鼻涕，比較嚴重的，會拉出青色糞，眼睛腫，甚至死亡。請問應如何治療？(台北縣

貢寮鄉吉林村內寮街五三號張守陽)  
●治療方法是以水溶性「泰滅淨」溶解於清水中，配成一、〇〇〇倍溶液給服，或將溶液混合於飼料中餵食，一天一次，連續三~五天。

●土雞也應該注意防風寒，請在雞舍西北方向實施防寒措施。並定期(每四~六個月)實施家禽霍亂菌苗與新城疫疫苗預防注射。(唐清岑)

