

專門防治 梨、蘋果黑星病 及桃縮葉病

在系統性殺菌劑普遍發生抗藥性的情形下，轉換噴射「新靈」殺菌劑，會有意想不到的優良效果。

新

靈

65

殺菌劑

〔說明書函索即寄〕

瑞典確實可佳化學廠 榮譽出品



德城行有限公司 總代理
台北市仁愛路二段72-9號2樓~1
電話：(02) 3912062·3935360

●木瓜人工授粉是先摘除快開而尚未開，且花粉已成熟的兩性花蕾。再將雌株上快開而尚未開雌蕊的花瓣剝開，用毛筆沾或用錫子夾兩性花的花粉塊，輕輕且均勻塗在雌花柱頭上。

○授粉後用臘光紙袋套上並綁線，以後不必打開，因果實長大時，可自行擠破臘光紙袋。

○「台農雜交二、三號」均為第一代雜交種，不能再採種，否則後代會分離，果型不整，果肉顏色不一，有黃肉也有紅肉，品質不穩定。(王德男)

檸檬樹附生地衣

●檸檬枝幹上常有地衣附着，影響生長。請問應如何防治？(屏東縣新理鄉建巧村建巧路九六號張鏡湖)

●地衣易發生於通風不良，濕度較高的柑園，防治法為：

○整理園內防風林，改良通風。
○加以適當修剪，改善日照及通

風。
○地衣發生初期，可噴PCP(克龍)○三多液清除之。
○地衣為害較嚴重時，先用刷子刷去地衣再噴藥。(翁仁稼)

松樹採種

○採樹可否以實生法繁殖？種子何時採收？何時播種？

○松樹的種子採收期及播種方法又如何？(苗栗縣苗栗鎮中正路六一號賴雲添)

○可以，但一般多用打種法繁殖。採樹種子是在秋季採收，秋播春播均可。播種時苗床須選用排水良好的砂質壤土，保持土壤濕潤，以利發芽。

○秋季為松果的採收期。松果採收後，需日晒七日，鱗片裂開，把動使松子全出果外，再篩去雜物，就可得種子。

○播種採用春播，苗床以砂質土壤為佳。播種後覆以鬆土，注意灌水，

保持濕潤。四星期左右可以發芽。發芽後需以竹簾等遮蔽，以防日晒。傍晚時取去竹簾，使苗接受露水。春播者約在翌年春季移植。(楊紹博)

●我種在菜園中的梅樹常常只開花不結果。偶而結果，也在未成熟之時，全部落光，請問是何原因？(台中縣石岡鄉萬興村豐勢路八〇七巷一號陳徐鎮)

●梅屬落葉果樹，雖能在溫暖地區生長，冬季仍需相當「寒冷溫度」才能正常開花結果。而且開花期間尤宜日夜溫度變化不大的條件配合，才不會引起落花落果。所以貴處種梅如非樹齡太小或品種問題，主要為氣候欠適宜的影響了。(李信芳)

雞舍防寒

●土雞受寒，流鼻涕，比較嚴重的，會拉出青色糞，眼睛腫，甚至死亡。請問應如何治療？(台北縣



貢寮鄉吉林村內寮街五三號張守陽) 治療方法是：以水溶性「泰滅淨」溶解於清水中，配成一、〇〇倍溶液給服，或將溶液混合於飼料中餵食，一天一次，連續三、五天。

●土雞也應該注意防風寒，請在雞舍西北方向實施防寒措施。並定期(每四、六個月)實施家禽霍亂菌苗與新城疫疫苗預防注射。(唐清岑)