



## 稻種發芽不良

(1)

今年第一期作我是以自己留種的稻谷，經過選種，浸種兩天

，消毒三小時後才播種的。但播種後十幾天發芽率只有三〇%左右。留種的稻谷皆乾燥至含水分十四度左右，而且收種時還在水泥晒谷場晒乾後，才仔細保存起來。爲何發芽率會如此低呢？（展東縣竹田鄉竹南村潮州路三〇號鍾丙龍）

(2) 一般發芽不良的原因有：  
①品種問題：如臺南五號收割後立即播種，可能發生此情形。  
②秧田條件：播種期適逢低溫，或秧田播種後浸水過久，也可能發生類似情形。

(3) 漫種時間過短：第一期作播種過高，引起發芽不良。  
(4) 秧田條件：播種期適逢低溫，或秧田播種後浸水過久，也可能發生類似情形。

期間溫度過低，應先浸種三日夜後，取起消毒，再經催芽三六小時才可播種。否則會影響發芽。

(5) 以尼龍袋盛裝種子浸種：用尼龍袋浸種時，通風差以致種子發臭，引起不發芽。

根據你來信所述推測，發芽不良的原因可能是屬於四或五。（吳育郎）

## 土壤酸度調整

(1) 我種的四分多地柳橙，已達結果節。柑園中連續施用化學肥料如複合肥料、硫酸銻等，是否會使土壤變酸，影響產量？可否施用「苦土石灰」來中和土壤酸度？施用方法如何？（台南縣大內鄉二溪村一號葉進忠）

(2) 化學肥料尤其是硫酸銻、硫酸銨之類，連續使用多年後，最易使土壤變爲酸性。

「苦土石灰」雖有中和土壤酸性並供給養素的功效，但須視土壤的需要情形而定，所以先要測定土壤酸度如果土壤酸度，在P.H五·五以下時就可施用。每公頃五〇〇~一、〇〇〇公斤均勻施用。一年只可施一次，繼續三、四年。

又「白雲石」成份略同於「苦土石灰」，而售價較廉，因此改施白雲石較經濟。（翁仁祿）

## 烏豆

(1) 烏豆宜在何時播種？

(2) 春播產量有多少？

(3) 栽培管理方法與中高型品種大

(4) 烏豆有那些品種？用途爲何？

本藥劑係美國 FMC Corporation 在中華民國獲准發明專利之產品，其專利號碼為台專字第3314號。

中央標準局商標註冊證第86457號與第75837號與第40344號

**優良獎** **好年冬** **感謝大家愛用**

**好年冬**® 粒劑參考資料：**furadan**®

- 一、秧田：五斗稻種用一公斤好年冬，播種三天內，及插秧五天前各用一次。
- 二、水稻本田：生育初期或飽穗期各用一次好年冬3~4公斤/分地。
- 三、蔬菜：整地時每分地5公斤好年冬，生育初期每分地用3~5公斤好年冬。
- 四、雜糧：施肥或培土時每分地同時用5公斤好年冬。
- 五、果樹：每季施肥時或萌芽前，打穴施用好年冬於根群。

40.64% **好年冬精**® 推廣防治於

9大作物24種害蟲之優越殺蟲劑

水稻：電光浮塵子、斑飛蟲、褐飛蟲、二化螟蟲、縱捲葉蟲、稻心蠅、負泥蟲、黑尾浮塵子。

蔬菜：小菜蛾、擬尺蠖、蚜蟲、斜紋夜盜蟲、白粉蝶、切根蟲。

綠豆：莖潛蟲、香蕉：蚜蟲、高粱：蚜蟲、柑桔：蚜蟲。

櫟果：浮塵子、荔枝：果實蛀蟲、銹蝶、玉米：玉米螟、蚜蟲、青蟲。作物害蟲發生初期，應噴40.64%好年冬精稀釋800~1500倍用藥量0.8~1.5公升/公頃。



**正豐**

化學股份有限公司  
台中縣霧峰鄉民生路200號  
電話：(043)393201~3

**FMC**

台灣總代理：國際技術社股份有限公司  
國外製造廠：FMC Corporation  
Agricultural Chemical Division