

唯一真正作物用荷蘭蒙

促進發根及發育，刺激及提早開花。防止落花及落果，防止倒伏。適用於蘋果、梨、桃、蓮霧、荔枝、蕃石榴、葡萄等果樹，蕃茄、南瓜、西瓜及其他各種蔬菜，水稻及其他糧食作物，蘭花、菊花、玫瑰及其他園藝作物。



〔說明書函索即寄〕

美國綠林化學 榮譽出品
德城行有限公司 總代理
台北市仁愛路二段72-9號2樓~1
電話：(02) 3912062 • 3935360

3. 有時蜜蜂會成為它們自己的嚴重敵人。如缺少花蜜的時期，蜂蜜暴露於蜂巢附近，不同蜂羣的蜜蜂會為搶蜜而起鬭。鬭風會很快地由一羣落傳到另一羣落而擴散，而愈演愈烈，往往導致嚴重的損失。為避免搶鬭，不要把蜂蜜暴露於蜂巢附近。

加強海關檢疫

要保護台灣的蜂業因疾病（特別是美洲幼虫腐敗病）引起的損失，政府應立法加強海關檢疫工作。同時應訓練熟悉蜜蜂疾病的人才，於每年春天時檢查每一個蜂羣，如發現有美洲幼虫腐敗病，即應把蜂羣燒死，並把蜂巢封閉，防止有關疾病的擴散。

有關機構應購置活動性煙室 (Fumigation chamber) 巡迴消毒蜂羣用過的巢具，以便再用；蜜蜂的買賣應有無病證明時才准許轉手。其他如定期舉行蜂農講習會，指導蜂農鑑別病症與防治法，對於蜜蜂疾病的防治也有幫助。

農藥的濫用對於養蜂構成嚴重的威脅與損失，使用農藥應盡量選擇對蜜蜂毒害較微者，並加強輔導農藥的正確使用法，同時立法禁止把農藥直接噴在花上，以減少蜜蜂受農藥毒害的機會。

防止盜蜂方法

蜂場裡發生盜蜂，若盜者有病，會將病原傳染給受害者，反之，受害者有病，盜者將取得有病的蜂蜜，致全場蜂勢逐漸萎縮，強羣失勢，弱羣滅亡。

發生盜蜂主要是由於外界蜜源缺乏所致，搜索蜂四處覓食，徒勞無功，轉而尋找暴露的甜物。防範盜蜂的方法如下：

(一) 倘外界蜜源缺乏時，宜將巢門縮小，並且詳細檢視蜂箱，不許有任何縫隙。
(二) 檢查蜂羣時，速度要快，外露的巢脾，最易誘發盜蜂。

(三) 餵飼糖漿宜等傍晚時實行，滴落於箱外的蜂蜜或糖漿宜盡快用水沖掉。

(四) 最忌蜂勢強弱懸殊，弱羣極易被強羣掠奪，宜合併。失去蜂王的蜂羣，更應併入有王的蜂羣。

若發生盜蜂應及早制止：

(一) 縮小巢門至最低限度，約只容一兩隻工蜂出入，使被盜蜂易於守衛，並在巢門前放置鮮草，抵擋盜蜂，便利守護蜂反攻。

(二) 盜蜂太多時，只好緊閉巢門，而對來盜者噴水，減低盜風熱。

(三) 消滅盜蜂於巢前。

(四) 在被盜羣，蜂箱前板及降落板角落處塗以忌避劑，如未醒或其它不傷蜂體的藥物，使盜蜂不敢接近。



巢脾