

栽培優良甜玉米品種

玉米通常可以分爲七種，甜玉米爲其中一種。甜玉米穀粒爲角質半透明澱粉組成，胚乳組織不緻密，乾燥後外皮皺縮，富糖分，味甜，爲生食及製罐或冷凍之用。

甜玉米與馬齒種玉米僅有一個隱性遺傳因子的不同，此遺傳因子能阻止糖分變成澱粉。

本省過去栽培的玉米品種，主要爲馬齒種及硬粒種，其質硬，味淡，不適於食用，僅供作家畜飼料用。

本省適合栽培

栽培甜玉米最重要的條件是產量及品質，即產量要高，甜度要夠，風味要佳，果皮要薄。影響產量及品質的因素除了品種本身外，栽培環境、栽培技術及農民知識水準亦甚重要。

本省無論主觀及客觀條件皆適合發展甜玉米，茲將其主要特點舉例如下：

(1)生育期間短，易配合輪作制度，以果穗出售無需曬乾及脫粒。
(2)生產期在秋、冬季，溫度較低，品質不易變化。

(3)供應期長，自九月至翌年二月皆可以種植，供應期間長達半年。

(4)如灌溉設備完善，農民技術及知識水準高，肥料施用量足夠，可保持優良品質。

(6)本省交通方便，採收至處理期

間短，可保持品質。

(6)本省生產期與東南亞其他國家不衝突，有利於外銷。

(7)推廣栽培雜交種甜玉米，豐產、質優，同時可以控制種子，不至生產過剩。

優良推廣品種

目前本省推廣品種有二種：一、爲普通混交種，即夏威夷甜玉米；另一爲雜交甜玉米台南十三號。

夏威夷甜玉米由美國引進，自民國四十八年至五十年經品種比較試驗選拔，民國五十四年開始推廣；台南十三號於民國六十二年育成，果穗大、整齊、產量甚高。

夏威夷甜玉米及台南十三號均較抗煤紋病及葉斑病，但不抗露菌病，因此宜在非甘蔗栽培地區栽培，以免被感染。

台南區農改場朴子分場已育成抗露菌病雜交甜玉米，及超甜甜玉米，目前正試驗選拔中。

注意行株距

甜玉米栽培方法與普通玉米大致相同，但需

注意行株距。

甜玉米果

穗大小爲鑑定品質要件



本藥劑係美國 FMC Corporation 在中華民國獲准發明專利之產品，其專利號碼爲台專字第3314號，

中央標準局商標註冊證第86457號
與第75837號與第40344號

榮獲66年度全國 **優良廠牌獎** 感謝大家愛用 **好年冬**

好年冬® 粒劑參考資料：**furadan**® 40.64% **好年冬精**® 推廣防治於

- 一、秧田：五斗稻種用一公斤好年冬，播種三天內，及插秧五天前各用一次。
- 二、水稻本田：生育初期或飽穗期各用一次好年冬3~4公斤/分地。
- 三、蔬菜：整地時每分地5公斤好年冬，生育初期每分地用3~5公斤好年冬。
- 四、雜糧：施肥或培土時每分地同時用5公斤好年冬。
- 五、果樹：每季施肥時或萌芽前，打穴施用好年冬於根群。

9大作物24種害蟲之優越殺蟲劑
水稻：電光浮塵子、斑飛蟲、褐飛蟲、二化螟蟲、縱捲葉蟲、稻心蠅、負泥蟲、黑尾浮塵子。
蔬菜：小菜蛾、擬尺蠖、蚜蟲、斜紋夜盜蟲、白粉蝶、切根蟲。
綠豆：莖潛蛾、香蕉：蚜蟲、高粱：蚜蟲、柑桔：蚜蟲。
橡果：浮塵子、荔枝：果實蛀蟲、銹蟬、玉米：玉米螟、蚜蟲、青蟲。作物害蟲發生初期，應噴40.64%好年冬精稀釋800~1500倍用藥量0.8~1.5公升/公頃。



正豐

化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路200號
電話：(043)393201~3



台灣總代理：國際技術社股份有限公司
國外製造廠：**FMC Corporation**
Agricultural Chemical Division